




R. K. GROUP OF COLLEGE

BEHIND KALWAR POLICE STATION, KALWAR, JAIPUR (RAJ.)



INDEX

S. No.	Name of Experiment.	Page No.	Date of Experiment	Date of Submission	Remarks
1.	Families				
	Brassicaceae				
	Malvaceae				
	Asclepiadaceae				
	Poaceae				
	Solanaceae				
2.	Herbarium Tool				
3.	Biochemical Test				
	Protein Test				
	Starch Test				
	Cellulose Test				
4.	Economic botany				
	Wheat				
	Rice				
	Maize				
	Ashwagandha				
	Turmeric				
	fennel				
	Tea				
	Groundnut				
	Jabgol				

S. No.	Name of Experiment	Page No.	Date of Experiment	Date of Submission	Remarks
5.	Lab Apparatus				
	Autoclave				
	pH meter				
	Centrifuge				

family - Brassicaceae / Cruciferae
 सरसों - ब्रैसिका रूपीडीज

स्वभाव :- एकवर्षीय शाक

तना - वायवीय शाखित, वैलनाकार, उर्ध्व, अरीमिल, शाकीय
 ठीस, तने में गंधक भौंगिक के कारण तीखी गंध उपस्थित

पत्तियाँ - शाखीय व स्तंभिक, सरल, एकान्तरण, अनअनुपाती
 अष्टान्त, पीठाकार, एकशिरीय, जालिकावत शिरा विन्यास उप.



पुष्पक्रम - असीमाक्ष, असीमाक्षी, इसका ठपरी भाग
 समशिखी असीमाक्ष।

पुष्प - विपत्री, अष्टान्त, पूर्ण द्विलिङ्गी, नियमित, त्रिज्या
 सममित, चतुर्भि, जायांगायर, चक्रिक, पीले।

बाह्यफल पुंज - 4 बाह्यफल स्वतंत्र, मध्यस्थ बाह्य चक्र में
 तथा 2 अन्दर वाले चक्र में पाश्वरीय, कलाभ पाश्वरीय
 बाह्यफल सम्पुट।



फलपुंज - 4 फल स्वतंत्र फली, विकृति: रूप से
 विन्मासित, प्रत्येक फल में 2 अन्त या नखर तथा
 चौड़ा फलक उपस्थित, कौरस्पशी, पीले।

पुमंग - 6 पुंकेसर 2+4, चतुर्दीर्घी, 2 छोटे पाश्वरीय
 बाह्य चक्र में स्थित तथा 4 लम्बे पञ्चप अंग
 सिरे पर की - की के समुह में स्थित, हल्के पुंकेसरी



stamen and Gynoecium

HABIT



floral Diagram

Gynoecium

उपचय

EB $\uparrow$ $\oplus$ K_{2+2} C_{x4} A_{2+4} Gl(2)

पुंकेसरी के आधार पर चार मकरंदकौष स्थित, पराग कौष द्विकीर्णी, आधार लगन, २-फुटन लम्बवत् ।

जायांग :- द्विमण्डपी, संयुक्ताण्डपी, एक कीर्णीय, कृष्टपट बन जाने के कारण द्विकीर्णी ही जाता है।
 भित्तिम वीजाण्डन्यास उर्ध्व अण्डाशय, वर्तिका छीटी तथा वर्तिकाग्र, समुंड ।

फल - शूष्क, स्फीटी सिलिकुआ ।

family - Malvaceae

गुड्डल - ट्रिबिस्स, राजा साइनैन्सिस

स्वभाव - बहुवर्षीय क्षुप

तना - पाथवीय, शाखित, वेलनाकार, उर्ध्व, चिकना, शाकीय
उपरीतना शाकीय व निचला हिस्सा काष्ठीय, ठीस
हीता है।

पत्तियाँ :- शाखीय एवं स्तंभिक, एकान्तर, सशृन्त, सरल,
अनुपर्ण, मुक्त पार्श्वी, अनुपर्ण आश्चर्याती, अंडाकार,
पत्तियाँ के ककची किनारे, शीर्ष निश्चिताग्र तथा सतह
चिकनी होती है, एकशिरीय जालिकावत् विराजित्यास।


पुष्पक्रम :- एकल कक्षस्व

अनुवाह्यफलपुंज - 5-8 सहपत्रिकायै बाह्यफल पुंज के बाहर
एक चक्र में उपस्थित, मुक्त, कीरस्पर्शी, रीमिल,
हरी व रेखीय।

बाह्यफलपुंज :- 5 बाह्यफल, संयुक्त, कीरस्पर्शी, चिरलग्न।


फलपुंज :- 5 फल, प्रत्येकफली किन्तु आधार पर पुंकेसरी
नाल से जुड़े हुए, फल विन्यास व्यावर्तित, लाल बड़े
व शीभाकारी।

पुमंग :- असंख्य, एकसदी पुंकेसर फललग्न, पुंकेसर
पुंकेसरी नाल बनाते हैं जो अण्डाशय व वर्तिका को
घेरे रहती है। परागकीय एक कीर्षी, सुन्दर एवं काकार,




HABIT


flower



Androecium



Gynoecium



floral diagram

Br $\uparrow$ $\oplus$ Epik 6-7 k(s) C5-Ax GLS

પૃષ્ઠભાગ, વટિમુખી, નિસર્તિ, સ્ફુટન લમ્બવત્ ।

જાણાંગ :- પંચમઠડી, સંયુક્તાઠડી, પંચકોઠી, મધ્યમ
વીજાઠડ્યાસ ઉર્ધ્વ મઠડાશય વર્તિકા એક પુંડેસરી નાલ
સે ગુજરતી હર્, 5 વર્તિકામ્ બિમ્બામ્, લાલ ।

ફલ - સમ્પુટ (Capsule)

family - Asclepiadeceae

आक - कैलीटोपिस

स्वभाव - बहुवर्षीय झुप या खीरे वृक्ष समान

तना - वायवीय, शाखित, बेलनाकार, उथरी, रीमिल शाकीय ऊपर की ओर व काष्ठीय आधार पर क्षीर लेटेक्स उप, ठीस पत्तियाँ :-

शाखीय एवं स्तंभिक सरल, सघन, अर्ध स्तम्भालिंगी पत्राधार, अनअनुपत्ति, सम्मुख कासपत, चर्मिल, अंडाकार, किनारा अखिन्न शीर्ष निश्चिताग्र होता है। पत्र के निचली सतह पर मुलायम रीमी का आवरण पाया जाता है पत्र में दुधिया क्षीर उपस्थित होता है। एक शिरीय जालिकावत गिराविन्यास।

पुष्पक्रम (Inflorescence) :- बहुशाखी ससीमाक्ष

पुष्प (flower) - सद्यपत्री, सद्यपत्रिकाभुवत, सघन, द्विलिंगी, नियमित, त्रिज्या सममित, पंचतयी, आभांगधार, चक्रिक सफैद, वैंगनी।

बाह्यफल पुंज (Calyx) :- 5, स्वतंत्र बाह्यफल, पंचकी, फलाभ

फलपुंज (Corolla) :- 5 संयुक्तकली, आवर्ति, चंटाकार, सफैद।

पुमंग (Androecium) :- 5 पुंकेसर, वर्तिकाग्र के साथ

पुंकेसर के अंदर संसजन बनाते हैं जो पुंकेसर के अंदर पुंकेसर की पराग पिंड व उपबंधनियों से निमित्त होता है।



flower

leaf

stem

HABIT

Corpusculum



POLLINIA

Translator


stigma



style






ovary

Gynoecium



जायांग (Gynoecium) :- द्विअंडपी, विभुवतांडपी एक
वर्तिका का ऊपरी भाग तथा वर्तिकाग्र संयुक्त, वर्तिकाग्र
छत्र पंचकीर्ण, अंडाशय उर्ध्व।

फल - फॉलिकल का पुंज



पुष्पसूत्र - $Br \uparrow \% P_2 A_3 \underline{G_1}$

family - Poaceae / Gramineae

ग्रीक - ट्रिटिकम एस्टिवम

स्वभाव (Habit) :- एकवर्षीय शाक ।

तना (stem) :- वायवीय, शाखित, वेलनाकार, उर्ध्व, शाकीय, पर्व संधि सुस्पष्ट, तलशाखन उपस्थित, खोखला

पत्तियाँ (leaves) :- भृशान्त, एकान्तर, सरल, अननुपरी, पत्राधार आच्छाद उपस्थित, पत्र फलक व पत्राधार के जोड़ पर एक शाकी अतिवर्द्धित जिभिका उपस्थित, ग्रीष्म निक्षिप्ताग्र बहुशीरीय समान्तर विराजित्वास।


पुष्पक्रम (Inflorescence) :- कठिकाओं का कठिवा

पुष्प :- सहपत्री, भृशान्त, पूर्ण, द्विलिंगी, एक व्यास सममित, त्रितयी, जामांगधर, चक्रिक परिदलपुंज।


पुमंग :- 3 प्रत्येक पुंकेसरी, पुतंतु लम्बा, मुक्त कीली, अन्तर्मुखी।

जामांग - एक अण्डपी, एक कीली, एक सीमान्त बीजाण्ड सहित, वर्तिका अनुपस्थित, दो पिच्छकी वर्तिकाग्र

फल - कैरिओप्सिस





HABIT



T.S of ovary

Anther lobe



संकेतः

$EB \oplus \uparrow K_{(5)} \overline{C_{(5)}} A_{(5)} \underline{G_{(3)}}$

WITH ANEID SOMNIFERA

family - Solanaceae

अवगंधा - विद्यानिया सीमनीफेरा

स्पष्टाप - बहुवर्षीय शाक या क्षुपीय पादप।

तना - वायवीय, शाखित, वेलनाकार, उर्ध्व, शाकीय रीमिल, ठोस।

पत्तियाँ - शाखीय एवं स्तंभिक, सघुन्त, सरल, अनअनुपर्वी, एकान्तर। भंडाकार, रीमिल, शीर्ष निश्चिताग्र तथा एकशिरीय जालिकावत शिराविन्यास।

पुष्पक्रम - कक्षस्थ असीमाक्ष

पुष्प - सहपत्री, सघुन्त, पूर्ण, द्विलिंगी, नियमित, त्रिज्या सममित, पंचतयी, जायांगधार, चक्रिक।

वाह्यदलपुंज :- 5 संयुक्तदली, कीरस्पष्टी, चिरलग्न, शालकी उत्तरवर्धी

दलपुंज - 5 संयुक्तदली, व्यंताकार, कीरस्पष्टी

पुमंग - 5 पुंकेसर दललग्न, पुंकेसर वाह्यदल के सम्मुख, परागकीष आधारलग्न व द्विकीषी, अन्तर्मुखी।

जायांग - द्विअंडपी, संयुक्तांडपी, द्विकीषी, अक्षीय बीजांड-न्यास, उर्ध्व अंडाशय तिरछा व्यवस्थित, बीजांडासन फुला हुआ।

फल - बैरी (Berry)

Herbarium Tool

हरबेरियम उपकरणों व तकनीकी में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पौधों के जन्तुओं की इकट्ठा करना, तैयार करना शामिल है।

Tool

* दावेल :- जड़ी व मिट्टी के नमूने खींचने के लिए

* प्लांट प्रेस - पौधों के नमूने को समतल व सुखाने के लिए

* सीपता कागज - सुखाने के दौरान नमूने से नमी हटाने के लिए शीघ्र कागज का उपयोग।

* फील्ड नोटबुक - संग्रह विवरण, स्थान व अवलोकन रिकॉर्ड करने के लिए।

छुराई कुंजी :- पौधों की सामग्री को काटने व इकट्ठा करने के लिए

माउंटिंग शीट :- एसिड मुक्त कागज जिस पर नमूने लगाए जाते हैं।

लेबल :- इसका उपयोग नमूने की जानकारी अंश प्रजाति, संग्रहण स्थान और दिनांक को रिकॉर्ड करने के लिए।

जलरोधक स्याही व कलम :- नमूने को लेबल करने के लिए।

एकत्रित करना - लगे पौधों से नमूने एकत्र करने के लिए

कुल्लाडी व कुलाल :- बड़ी जड़ी व पौधों की खीकने के लिए

तकनीकें

- (1) संग्रह :- पौधों के नमूने एकत्र करना, संपूर्ण नमूने (जड़, पत्तियाँ, फूल व फल सहित) पर ध्यान केन्द्रित करना।
- (2) ढ़राना व सुखाना - नमी की हटाने व फंगस की बढ़ने से रोकने के लिए नमूनों की समाचार पत्रों के बीच समतल करना।
- (3) विघातता (वैविलिपकु) :- कीटी की मारने व संक्रमण की रोकने के लिए नमूनों की ढील से उपचारित
- (4) माउटिंग :- सुखे नमूने की गाँढ़, चिपकाने वाले पदार्थ या टैप का उपयोग करके हरबेरियम शीट पर चिपकाना।
- (5) लेबलिंग :- नमूने के बारे में जानकारी के साथ लेबल लगाना जिसमें प्रजातियों संग्रह स्थान व संग्रहकर्ता का नाम शामिल करना।
- (6) भंडारण - हरबेरियम शीट की बड़े ठण्डे, शुष्क व कीट मुक्त वातावरण में संग्रहित करें।

Test of Protein

AIM :- To demonstrate the test for protein in the unknown sample

उपकरण - टेस्ट ट्यूब, पिपेट, व्युमेट, स्पीक्ट्रोमीटर, BSA का स्टॉक विलयन, वाइयुरेट, अभिकर्मक, आसुत जल, कुंजी।

Theory :- सभी में सर्वाधिक रूप में मिलने वाला जैविक अणु प्रोटीन है प्रोटीन अणु 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनते हैं। यह रंगहीन होता है। वाइयुरेट टेस्ट सबसे सरल विधि है। इस विधि में सभी प्रोटीन के लिए एक समान समान बैंगनी रंग विकसित होता है।

अज्ञात प्रोटीन की सांद्रता की भी मानव वक्र की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। इसके लिए पहले प्रोटीन के ज्ञात मात्रा के अवशेषों का नीट करके मानक वक्र तैयार करते हैं।

सिद्धांत :-

(i) गुणात्मक टेस्ट :- प्रोटीन रंगहीन होते हैं, उन्हें वाइयुरेट में क्रिया जाता है। वाइयुरेट को परा सल्फेट के stain सांद्र विलयन से क्रिया कर बैंगनी रंग उत्पन्न बैंगनी रंग उस विलयन में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है, इसे गुणात्मक टेस्ट कहते हैं।

(ii) मात्रात्मक टेस्ट :- विलयन में प्रोटीन की मात्रा

स्पीक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा जितना अवशोषण प्रीलीन की मात्रा उपस्थित उतना ही गहरे बैंगनी रंग का होगा।

विधि :-

(i) 6 टेस्ट ट्यूब लेकर उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नम्बर डालें।

(ii) पिपेट की सहायता से टेस्ट ट्यूबों में जल स्वानान्तरित करते हैं।

(iii) तत्पश्चात् 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mm BSA प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में डालें।

(iv) पुनः 2 ml वाइयुरेट अभिकर्मक प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं।

(v) 2 मिनिट - 2 टेस्ट ट्यूब लेकर उन्हें A व B मार्क करें।

(vi) प्रत्येक A व B सैम्पल से 1 ml प्रीलीन सैम्पल A व B में स्वानान्तरित करें।

(vii) इसमें 2 mm वाइयुरेट अभिकर्मक डालते हैं।

(viii) प्रत्येक टेस्ट ट्यूब की अच्छी तरह से हिलाते हैं।

(ix) अब टेस्ट ट्यूब की कुंघरे के तापमान पर 15 मिनिट के लिए रख दें।

(x) स्पीक्ट्रोफोटोमीटर को ऑन करें।

(xi) 15 मिनिट स्पीक्ट्रोफोटोमीटर गर्म करके कुवेट में आसुत जल भरें।

(xii) जल भरते कुवेट का उपकरण भी अन्दर वही स्वान में सावधानीपूर्वक रख कर आवश्यक मान 0 सेट करें।

(xiii) अब ब्लैंक का मान सारणी में अंकित करें।

(xiv) टेस्ट ट्यूब की मान को उपकरण से जात करें।

परिणाम व निष्कर्ष :-

X अक्ष पर मानक प्रोटीन विलयन की सांद्रता तथा Y अक्ष पर अवशोषणता का मान रखकर ग्राफ कही यह प्रोटीन वक्र कहलाता है। इस ग्राफ में नमूने में प्रोटीन की मात्रा है।

सावधानियाँ :-

- (i) विलयन सावधानीपूर्वक बनाने चाहिए।
- (ii) रीडिंग ध्यानपूर्वक लेनी चाहिए।

Test of starch

AIM :- To demonstrate the test for starch in the unknown sample.

उपकरण :-

चावल, गीहूँ व मक्का का आटा, जल, चाटना, डिशा, टेस्ट ट्यूब, कैपिटि, रिप्रेंटलेम्प, आयोडीन।

विधि :-

- (i) तीन परखनली में 10 ml गर्म जल लेकर उसे [A, B, C] नाम देते हैं।
- (ii) A में चावल, B में गीहूँ व C में मक्का का 0.5 आटा मिला लेते हैं।
- (iii) इसके बाक उन्ही चौड़ी पैर विलयन सीट ही में पर इसके ऊपरी विलयन की अलग करके A, B, C लेवल करते हैं।
- (iv) प्रत्येक विलयन में कुछ बूँद आयोडीन की डालते हैं।

परिणाम :-

प्रत्येक डिशा में जल नीला ही जाता है जो मंड की उपस्थिती कहता है।

सावधानियाँ :-

0.3 gm आयोडीन की आसुत जल में घोलकर आमतन 100 ml कर ली।

Test for Cellulose

ATM :- To demonstrate the test for Cellulose in the unknown sample

उपकरण - स्लाइड, कॉटन, KI विलयन, सांद्र H_2SO_4

विधि :-

- (i) एक स्लाइड लेकर उस पर कुछ कॉटन के रेशे रखते हैं।
- (ii) रेशे पर KI की कुछ बूंदें डालते हैं।
- (iii) KI के पश्चात् स्लाइड पर रखी रेशे पर सांद्र H_2SO_4 की कुछ बूंदें डालते हैं।

परिणाम : रेशे का रंग नीला व काला पड़ जाता है यह रंग सेल्यूलोज की उपस्थिति की दशांति है।

1891



1891

1891

1891

1891

1891

चावल (Rice)

B.N - श्रीराज साहस्रम

family - पीसी

Sub species - श्रीराजजीनी

उत्पत्ति स्थान :- एशिया (भारत दक्षिण पश्चिम भाग)

वितरण (i) विंध्य :-

अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया,
वियतनाम, वमि, फिलीपीन्स।

(ii) भारत :- कर्नाटक, म.प, उ.प, प. बंगाल, बिहार।

उपयोगी पादप भाग - बीज

जैव रासायनिक तत्व - प्रोटीन, लायसीन, स्टार्च,
चायमीन, राइबोफ्लेविन व व ह

Use of Rice

- (i) सैला चावल - द. भारतीय भोजन के रूप में।
- (ii) मुरमुरा चावल - स्नैक्स व भेलपुरी बनाने में।
- (iii) खील - भारत में दिवाली पर पूजा के काम,
भुन कर खाने में।
- (iv) पीडा
- (v) अनाज - उबाल कर पुलाव, खीर, इडली, डोसा
बनाने में।
- (vi) मंड - वस्त्री की बुलफ देने में।
- (vii) रूद्रा - रूद्रा की वस्तु टीकरी, चटाई, बेलें
बनाने में।

वानस्पतिक लक्षण :-

- (i) चावल का पौधा अल्पजीवी 6 माह व 1 वषीय व जलीय पौधा होता है।
पादप जड़, तना व पत्तियों में विभाजित जड़ें
- (ii) अपस्थानिक व ऐसीकार तना दुर्बल व चिकना, पर्व खोखले।

- (iii) भूसी सहित चावल की धान (Paddy) कहते हैं।
आवरण उतरने पर धिलका
सफेद व हल्के पीले रंग के।



ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ । ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ କରୁଛି ।
ଏହି ମଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏହିପରି କରୁଛି ।
ଏହି ମଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏହିପରି କରୁଛି ।
ଏହି ମଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏହିପରି କରୁଛି ।
ଏହି ମଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏହିପରି କରୁଛି ।



ଏହି ମଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏହିପରି କରୁଛି ।
ଏହି ମଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏହିପରି କରୁଛି ।
ଏହି ମଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏହିପରି କରୁଛି ।
ଏହି ମଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏହିପରି କରୁଛି ।
ଏହି ମଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏହିପରି କରୁଛି ।

गेहूँ (Wheat)

B.N - ट्रिटिकम जाति
पीएसी

family - ट्रिटिसिनी

sub family -

उत्पत्ति स्थान - मध्य एशिया

वितरण :-

(i) विश्व :- भारत, चीन, USA, रूस, कनाडा, जर्मनी, पाकिस्तान।

(ii) भारत - पंजाब, हरियाणा, U.P, बिहार, असम, प. बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, म.प्र., कश्मीर।

उपयोग पादप भाग - बीज

जीव रासायनिक तत्व - स्टार्च 71.7%, प्रोटीन 12.5%, वसा 1.8%.

पानस्पतिक लक्षण :-

(i) गेहूँ का पादप अल्पजीवी 6 माह, पीछा अक्षयित उर्वर होता है।

(ii) पादप जड़, तना, पत्ती में विभक्तित, तना बेलनाकार, दुर्बल, चिकना, पर्व खीखल, पत्तियाँ एकान्तर क्रम में होती हैं।

(iii) पादप की जनन भावस्था में पादप की वायवीय असीमाक्षी भाग के वीर्य भाग में स्पाइक फुल्लक्रम लगती है।

Use of Wheat :- गीहूं भुने हुए होनेक पीटफ्लैक्स

(i) कलिया - नमकीन व मीठा कलिया भोजन के रूप में

(ii) गीहूं चोंकर रफैज के रूप में शुपान्य चपाटी।

(iii) उगाहा - बीड, चपाती केक, बिस्कुट, कीयर, गाराव
में स्टार्च के रूप में।

(iv) गीहूं तृण - कुसियाँ, साँफे आदि भोजन के काम।

मक्का (Corn)

B.N - जिमा मैज
 पीएसी
 family - मैडडी
 sub. family - मैक्सिकी
 Native place - कीज
 plant part use -

वितरण :-

(i) विश्व :- अमेरिका, चीन, ब्राजील, फ्रांस, भारत, मैक्सिकी।

(ii) भारत - U.P, खज, पंजाब, म.प, बिहार।

अर्थ रासायनिक तत्व :- अमाइलीपीक्टिन स्टार्च, सांयटीकाइनिन, जिआटिन।

मक्का के वानस्पतिक लक्षण :-

(i) मक्का का पादप अल्प जीवी 6 माह पीछा उर्ध्व लगभग 1.45m लम्बा पादप अड, तना में विभक्त।

(ii) तना आधारिय भाग में मोटा व शीर्ष पर पतला व लम्बा पादप उभयलिगांभी पादप में ही प्रकार के पुष्पक्रम व्यवस्थित।

(iii) नरपुष्पक्रम मुख्य अक्ष के शीर्ष पर, मादा पुष्पक्रम खालान्तरित पार्श्व शाखाओं के पार्श्व पर लगते हैं।

Use of Coem :-

(i) पाँप कॉन के रूप में।

(ii) कॉन पल्लवस के रूप में।

(iii) मक्का के ल्यंजन - मक्का का दलिया (खिचड़ी)
मक्का की रावडी, स्नैक्स दीकला, मक्का की खीस।

(iv) एल्कीडॉल बनाने में।

(v) पशु चारे के रूप में।

(vi) मक्का के पादप के तने व डंठली से वैपर तैयार किया जाता है।

अश्वगंधा, असंगाधा (Ashwagandha)

B.N - विवानिया-सीम्नीफेरा
सीलेनीसी

family -

Native place - भारत

plant part use -

औष रासायनिक तत्व - एल्केनॉइड, सीम्नीफेरिन,
निकीटिन व विटैफरीन आदि।

Use of Ashwagandha :-
(i) कफ के उपचार में उपयोगी।

(ii) स्त्री रोग में उपयोगी।

(iii) चर्म रोग जैसे अल्सर, फोटी, जलन दूर करने,
मवाद कम करने में उपयोगी।

(iv) र्यूमैटिक ज्वर के दर्द में पैरालिसिस अवस्था
के उपचार में उपयोगी।

(v) बहरपन में उपयोगी।

(vi) विवाहित पुरुषों में धातु की मात्रा बढ़ाने में
सहायक।



with regard to

R. W. ...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

हल्दी (Turmeric)

B. N - कुर्कमा लोंगा ।

family - जिन जीवरीस

Native place - द. एशिया

plant part use - प्रकन्द

वितरण - (i) विश्व :- इंडोनेशिया, श्रीलंका, चीन, ताइवान
(ii) भारत - आंध्र प्रदेश, केरल, म.प्र., बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक ।

औष रासायनिक संग्रहित :- पीले रंग का पदार्थ - कुर्कुमिन
संगंध तेल - फैलेन्ड्रीन सीस्क्वाटर्पीन, कीटोन-टेमरीन ।

पानरूपतिक लक्षण :-

(i) हल्दी का पादप बहुवर्षीय 70-100 cm लम्बा शाक है भूमिकंद प्रकंद छड़ी व भुरी पत्तियाँ में आवरित ।

(ii) पत्तियाँ आकार में बड़ी ।

(iii) पुष्पक्रम में पीले रंग के पुष्प, अविकसित फल देहसुल ।

Use of Turmeric :-

(i) भोजन - सब्जियों व अचार में रंग व खुशबू के लिए ।

(ii) रीली / कुमकुम - पुजा इत्यादि में मावी पर टीके के रूप में

(iii) कफनाशक - कफ व खांसी दूर शीघ्र होती है

(iv) एन्टीसेप्टिक - भट फाँटे - फुँसी व मवाद ठीक करने में

(v) रक्तशोधक - भट रक्तशोधक का कार्य करती है

(vi) प्रशासन सामग्री - विभिन्न प्रकार की क्रिम बनाने में ।



Handwritten text in Malayalam script, likely a title or introductory notes, positioned above the central illustration.



Handwritten text in Malayalam script, located below the rice grain illustration.

Handwritten text in Malayalam script, continuing the notes or instructions.

Handwritten text in Malayalam script, organized into several lines with some indentation.

Handwritten text in Malayalam script, forming the bottom section of the page.

सोंफ (fenmel)

B.N - फीनीकुलम वलगर

एपीएसी

family -

Native place - भुमध्यसागर क्षेत्र

plant part used - कीमीकार्क

वितरण - (i) विश्व - भारत, मित्र, चीन व मीरवकी।

(ii) भारत - पंजाब, आसाम, महाराष्ट्र व गुजरात

औष रासायनिक यौगिक - 1-6% सुगंध तेल एनिबॉल
व फेनकोन 12-18%, अर्द्ध शुष्क स्विट तेल।

सोंफ के वानस्पतिक लक्षण :- (i) पादप लम्बा, बहुवर्षीय
शाक व तीव्र गंध दूर-2 फैलती है।

(ii) इसकी पत्तियाँ बड़ी व अत्यधिक शाखित, आधार
चौड़ा व तनी से आवरित।

(iii) पुष्प, हरे, पीले, छोटे आकार के संयुक्त छत्रक
पुष्पक्रम में व्यवस्थित फल अण्डाकार हरे रंग का।

Use of fenmel :- सोंफ अचार में मसाले के रूप में

(ii) बेकरी में सुगंध के लिए

(iii) सुगंध तेल साबुन, अर्धवर्षीय रस व पेय पदार्थों
से सुगन्धित करने के लिए।

(iv) सोंफ वातहर व उद्दीपक।

(v) यह नवजात शिशुओं की माताओं की पानी के
साथ उबाल कर दिया जाता है।



W.B.
Native
plant

1. Plants of the forest (i) - Tamar
of the forest (ii)

1. Plants of the forest (i) - Tamar
of the forest (ii)

1. Plants of the forest (i) - Tamar
of the forest (ii)

1. Plants of the forest (i) - Tamar
of the forest (ii)

चाय (Tea)

B.N - कैमेलिया साइनेन्सिस

family - विरसी

Native place - भारत

plant part used - सुखी पत्तियाँ

वितरण - (i) विश्व :- भारत, अफ्रीका, इंडोनेशिया, बर्मा, रूस, चीन, जापान, श्रीलंका।

(ii) भारत :- असम, केरल, दार्जिलिंग, अन्नामलाई, नीलगिरी पर्वतीय।

जैव रासायनिक यौगिक -

(i) जल अघुलनशील - ऐंशी, सैल्युलीज ए-टार्च, प्रोटीन

(ii) जल घुलनशील - पॉलि फॉनिक यौगिक, अमीनी अम्ल, शुद्धि, कार्बनिक अम्ल।

चाय के वानस्पतिक लक्षण :-

(i) चाय की कृषित जाति 10-15m ऊंची सदाबहार बहुवर्षीय काष्ठीय झाड़ी।

(ii) पत्तियाँ, सरल, भालाकार, चर्मिल तैल गंधी युक्त, रमिल, हरी, कंकची किनारे वाली।

(iii) तैल गंधी के कारण सुगन्धित व सुस्वाद होता है।

Use of Tea :- (i) उद्दीपक पेय पदार्थ - सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ है।

(ii) मँहदी के साव - वाली के पीछे पदार्थ के रूप में।

(iii) वाली का तैल - कई कंपनियाँ आजकल मँहदी के साव टी-लीफ मिलाकर उत्पाद तैयार कर रही हैं।

1944



1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

मुंगफली (Groundnut)

B.N - एरिकस हाइपीजिमा
 फैबेसी
 family - पैपिलीयानीनेटी
 sub family - ब्राजील
 Native place - बीज
 plant part used -

वितरण - (i) विश्व :- भारत, चीन, इंडोनेशिया,
 अफ्रीका, अमेरिका, अर्जेंटीना।
 (ii) भारत - राज., पंजाब, बंगाल, बिहार, म.प्र.,
 गुजरात, आंध्र प्रदेश।

जैव रासायनिक संग्रह - वसा - 36%.

N_2 - 25%.
 एरसिड व वसीय अम्ल - 36%.

पानस्पतिक लक्षण :-

- (i) मुंगफली का पौधा छीटा 0.3 - 0.5m लम्बा इमान बाखित व वार्षिक शाक है।
- (ii) फूल पीले, पुंकेसर 10 व 1 अण्डपी सीमांत बीजाण्ड्यास पाया जाता है।
- (iii) अण्डाशय के आधारीय भाग में विभज्योतिकी cell उप. रहती है।

Use of Groundnut :-

- (i) मुंगफली खाद्य तेल विश्व में प्रसिद्ध है।

(ii) वनस्पति की - मुंगफली के तेल से हाइड्रोजनीकरण के पश्चात् वनस्पति की बनाया जाता है।

(iii) ऑयल रीक - यह खाद बनाने के काम
(iv) पीनट वटर - यह कम कैलरी मक्खन डीने से
दिल के मरीजी के लिए उपयोगी।

(v) भाँखली - मृदु विरैचक व स्नेहक के रूप में

(vi) उद्योग - क्रीम व साबुन बनाने में

(vii) पशु आहार - खली के रूप में पशुओं की
खिलाया जाता है।

(viii) कृत्रिम फाइबर - फाइबर तैयार किया जाता है।

(ix) फसल उर्वरक - वातावरण में N बढ़ाकर मृदा
उर्वर बढ़ाता है।

(x) गुच्छ मीठा :- मीठा के रूप में खाया जाता है।

इसबगील (Jabhool)

B. N - प्लांटींगी और वीटा

family - plantaginaceae

Native place - India बीज की भुसी

plant part used -

वितरण - (i) विश्व - भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान

(ii) भारत - गुजरात, राज., म.प., उ.प., हरियाणा।

औषध रासायनिक और भौतिक - म्युजीलैस, अमीनी अम्ल, सैल्युलोज, हैमीसैल्युलोज।

इसबगील के वानस्पतिक लक्षण :-

(i) वार्षिक शाकीय पौधा 30-45 cm ऊंचा होता है।

(ii) संकीर्ण रेखाकार व आधार व विपरीत व्यवस्था में पत्तियाँ।

(iii) खीरे, सफेद से हल्के गुलाबी रंग फूल कांटेदार पुष्पक्रम में होते हैं।


(iv) पुष्प द्विलिंगी होता है।

Use of Jabhool :- (i) पाचन स्वास्थ्य :- यह आंतों की क्रिया को बेहतर बनाता है।

(ii) वजन नियंत्रण - पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।

(iii) विषाक्त पदार्थों का उन्मूलन :- शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है।

Teacher's Signature.....



Autoclave

The autoclave is a device used for sterilizing equipment and media. It works by using high pressure and high temperature to kill microorganisms. The autoclave is typically used in laboratories and hospitals. The autoclave is a cylindrical chamber with a hatched pattern representing insulation. The chamber is surrounded by a jacket, which is filled with water. At the top of the chamber, there is a safety valve and a rubber gasket. A seal is located at the bottom of the chamber. A heat control system is connected to the bottom of the chamber, with a line leading to a heat control unit. The diagram is labeled with the following parts:

- safety valve
- rubber gasket
- seal
- Bucket
- Jacket
- water
- Heat Control



ऑटोक्लेव (Autoclave)

- (i) ऑटोक्लेव स्टील व कॉपर का बेलनाकार ढाँढरी भिन्नि भुवत हीता ह्य।
- (ii) अह बलॉसवीयर, संवधन विभिन्न माध्यमी, कॉटन, फिल्टर पैपर आदि की निर्जमीकरण के काम आता ह्य।
- (iii) इसका एक हिस्सा ढक्कन के रूप में खुलता ह्य तब्या जिस पदार्थों की ऑटोक्लेव करता ह्य उसी इसके अंदर रख देते ह्य।
- (iv) इस उपकरण के अंदर ताप व प्रेशर की नियंत्रित किया जाता ह्य।
- (v) ऑटोक्लेव में 1 सैफ्टी वाल्व तब्या एक नियंत्रण पुजि हीता ह्य।

Lab 10

1. To determine the pH of a solution using a pH meter.


2. To determine the pH of a solution using a pH meter.



3. To determine the pH of a solution using a pH meter.

pH मीटर

- (i) सीरेंसन ने 1809 में pH शब्द का उपयोग किया
- (ii) किसी भी विलयन में उपस्थित प्रभावकारी H^+ आयनी की सांद्रता के र्गोनात्मक लघुगुणक को pH मान कहा जाता है।
- (iii) pH उपकरण में की इलेक्ट्रोड व 1 pH डायल होता है।
- (iv) pH का मान pH मीटर से ज्ञात किया जाता है।
- (v) इसके द्वारा विलयन की अम्लता व क्षारीयता को ज्ञात किया जाता है।



dig - Centrifuge

Centrifuge

(i) यह एक गीस पदार्थ होता है जो बहुत उच्च गति पर घुम कर कणी अवयव पदार्थों की अपकेन्द्री बल के द्वारा उनके संघनता व हल्यमान बल के आधार पर अलग कर देता है।

(ii) सैन्ट्रीफ्यूज एक घातु का बना उपकरण होता है जिसमें एक स्टेण्ड होता है। ऊपर का हिस्सा चौड़ा होता है जिसमें घातु के कप होते हैं।

(iii) अपकेन्द्री बल की परिक्रमण / मिनट अवयव कोणिक गति से ज्ञात किया जाता है।

अपकेन्द्री बल = कोणिक वेग $\times$ त्रिज्या
कोणिक वेग, घूर्णन प्रति मिनट द्वारा दर्शाया जाता है।
कोणिक वेग = $2\pi \times \text{rpm} / 30$ त्रिज्या / सेकण्ड

सावधानियाँ :-

ध्यान रखना चाहिए कि सैन्ट्रीफ्यूज में पदार्थ रखने से पूर्व कप में उसकी मात्रा उचित हो।