



R. K. GROUP OF COLLEGE

BEHIND KALWAR POLICE STATION, KALWAR, JAIPUR (RAJ.)




S.No.	Name of Experiment	Page No.	Date of Experiment	Date of Submission	Remarks
	Dissection - Swim bladder				
	- Cranial Nerves				
	- General Visceral & Alimentary Canal of Labeo				
	- Afferent & Efferent branchial vessels of Labeo				
	Permanent Slide Preparation -				
	Oral Hood of Amphioxus				
	Scales of fishes				
	Hair of Mammals				
	Developmental biology -				
	Study of chick Embryo :- 18 Hrs.,				
	21 Hrs., 33 Hrs., 48 Hrs., 72 Hrs., & 96 Hrs.				
	of incubation.				
	Study of Extra embryonic membranes				
	in chick development.				
	Study of developmental Stages :-				
	blastula, Gastrula, neurula, Cleavage.				
	I Spots -				
	Protochordates - Hexdmania				
	Oikopleura				
	Ascidia				
	Botryllus				
	Agnatha - Petromyzon				
	Myxine				
	Ammocoete larva				

S.No.	Name of Experiment	Page No.	Date of Experiment	Date of Submission	Remarks
	Pisces - Torpedo				
	Chimaera				
	Labeo				
	Anguilla				
	Hippocampus				
	Echeneis				
	flat-fish				
	Amphibia - Ichthyophis				
	Salamander				
	Hyla				
	Rana				
	Reptilia - Testudo				
	Chelone				
	Tortoise				
	Draco				
	Chameleon				
	Eryx				
	Naja				
	Viper				
	Crocodilus				
	Aves :- Pavo Cristatus				
	Choriotis				
	Columba				




Date _____
Page _____

Dissection




[A] PHYSOSTOMOUS

[B] PHYSOCLISTOUS




[C] SWIM BLADDER

Teacher Signature




DIG:- CRANIAL NERVES IN LEECH



DIG :- GENERAL VISCERA & ALIMENTARY CANAL OF LABEO

Teacher Signature

Teacher Signature



DIG :- AFFERENT & EFFERENT BRANCHIAL VESSELS OF LABEO

Permanent
Slide
Preparation




Fig:- ORAL HOOD OF Amphioxus

Oral Hood of Amphioxus

Characters →

- i. एम्फीऑक्सस के छात्र क्षिरे पर लुण्ड के नीचे मुख पाया जाता है।
- ii. यह देह के पृष्ठ व पार्श्व पृष्ठों से बना होता है।
- iii. मुख छुड़ के भीतर जिलेटिनी टुकड़ों का एक पल्लय कुंकल पाया जाता है।
- iv. पल्लय कुंकल से कठोर नुमा प्रपथ निकले रहते हैं, जो मुख स्पर्शकों का अंश कुंकल बनाते हैं।
- v. मुख छुड़ एक व्याले नुमा गुंथ अवस्था प्रगण को ठेरे रहता है।
- vi. भुक्रांग के हर क्षेत्र में एक खाँच पायी जाती है, जो अगले क्षिरे पर गर्त के रूप में समाप्त होती है।

Scales of fishes

Fishes में शल्क त्वचा का रूपांतरण होते हैं। मछलियों में Placoid, Cycloid, Ganoid, Ctenoid, Rhomboid आदि प्रकार के शल्क पाये जाते हैं।

शल्क पृथक् करने कि विधि → जैसी जैसी रूपाय मछलियों में चक्रिय शल्क पाये जाते हैं, वैसे, चिमटी की सहायता अलग निकाला जा सकता है। त्वचा से अलग करने हेतु चिमटी की नोक अथवा स्केलपेल या चूल्ह की सहायता ली जा सकती है। शल्क गन्ध के लिए एक/दो शल्क त्वचा से अलग करे। इनके त्वचा के तन्तु के स्थान पर भाँपे आंतरिक उतलु लगा रह गया। तो इस चक्र से इस प्रकार अलग करे, कि शल्क साविग्रस न हो। शल्क को निर्जलीकृत करे व अभिरक्षण हेतु फिफ्टाईडिंग कार्मिन / अन्य उपलब्ध उपयुक्त अभिरक्षण उस ले। डी. पी. एक्स / कनाडा बाल्सम / अन्य उपलब्ध माउंटिंग अन्य काम लेकर स्पाई स्लाइड बनाएँ।

Structure → चक्रिय शल्क आकार में बड़े। इनमें मछली की आयु बढ़ने के साथ वृद्धि होती है, जो वृद्धि रेखाओं के रूप में देरी जा सकती है। ये वृद्धि रेखाएं शल्क को चक्र जैसा स्वरूप धरती है जिसके कारण इन शल्कों को चक्रिय शल्क कहा जा सकता है।

Characteristics →

- ये शल्क आस्थिल मछलियों का वाह्य कवच बनाते हैं।
- ये शल्क तीरछी पार्श्वों में विन्यासित होती हैं।
- ये शल्क चक्रिय आकृति के होते हैं।
- इन शल्कों पर घृत्ताकार रूप से विन्यासित वृद्धि रेखाएं पायी जाती हैं।





Fig :- SCALES OF LABEO



Dig :- STRUCTURE OF HAIR

Hair of Mammals

स्तनियों के लसनों में स्तन ग्रंथि की छप् के आतिरिक्त लचा पर बाल पाये जाना इसका विशिष्ट लक्षण होता है।

बाल प्राप्त करने की विधि → मिमटी की सहायता से एक रोम/बाल प्रत्यक्ष छर पोच गलास में ले।

A. सम्पूर्ण माउंट / Whole Mount → सम्पूर्ण रोम को पूर्ण में पणित विधि द्वारा निर्जलीकृत कर

Characteres → i. रोम/बाल लचा में लपेटर्मिस से व्युत्पन्न संरचनाएं हैं।
ii. बाल की संरचना की दृष्टि से दो भागों में बांटे - I. Hair root II. Hair shaft

I. Hair Root → i. यह रोम का वह भाग है, जो लचा में घसा हुआ होता है।
ii. रोम जड़ का आधारी छोर एक छंद/बल्ब के रूप में फैला हुआ होता है, जो रोम छंद उद्भूत है।

iii. रोम जड़ में छप् टर्मिस में माइन रफ्त कोशिकाओं व तारिकाओं के संवैदी छोर बहता था + त में पाये जाते हैं।

iv. प्रत्येक रोम छुटिका के समक्ष एक तैल ग्रंथि व्युत्पन्ती है। रोम छुटिका को मिली दो स्तरों में विभेदित - बाहरी व भीतरी मूल रपोल।
बाहरी मूल रपोल एपीडर्मिस के मूल स्तर की तरह होती है।
भीतरी मूल रपोल फिर छु स्तरों में विभेदित -

1. क्यूटिकल
2. एक्सले कु स्तर
3. इन्ले कु स्तर

II. Hair Shaft → i. यह रोम/बाल का लचा के बाहर निकला हुआ भाग होता है।

ii. रोम के इस भाग की cells वर्ण रूप से शल्कीभूत होकर सूत हो जाती है। अं: रोम काण्ड का बाहरी भाग नीलिव होता है।

T.S. of Hair

रोम को पिय में रखकर तेल धार वाली क्लेड की सहायता से अनुप्रस्थ काट का उपरोक्त वर्णित विधि से स्पाई स्लाइड बनायी जा सकती है।


Characteres → तान/रोम के अनुप्रस्थ काट से हमारे 3 मुख्य भाग देखे जा सकते हैं:-

i. **क्लाइकल/Cuticle** → यह रोम का सबसे पतला व बाहरी भाग होता है।


ii. **कॉर्टेक्स/Cortex** → यह क्लाइकल के नीचे स्थित होता है व रोम का मध्य अंतर बनाता है।

iii. **मेडूला/Medula** → यह रोम का सबसे आंतरिक अंतर होता है। बाल-तंतु में परस्पर सटी गहमूनिंग कोशिकाएं पायी जाती हैं, जो एक अश का निर्माण करती हैं, जिनसे मध्य अशकटते हैं।

बड़ी जंतुओं में रोम / बालों की आधारभूत संरचना समान होती है, अंतर केवल मेडूलरी अश में होता है।



Dig:- T.S. OF HAIR



Dig:- MAN

Dig:- COW

Dig:- GOAT

Dig:- DOG

Developmental Biology

Various Stages of Development of Chick

18 Hours Stage of Incubation

Characteristics →

- i. 18 घण्टे के उपमायन के पक्ष्यात आदि रैखा नोटोकोर्ड, न्यूरोस प्लेट व-पण्ट दिवार देते हैं।
- ii. न्यूरोस प्लेट के अग्रे छिरी पर डो-एम्निओन विकसित होता है।
- iii. न्यूरोस प्लेट डेस्कन नोड द्वारा आदि रैखा से पुष्पक बंदनी है।
- iv. ऑपेका क्षेत्र व पैलसिडा क्षेत्र व-पण्ट दिवार देते हैं।
- v. यह रैख प्रबुध अवस्था भी उदलानी है।
- vi. आदि रैखा बनने के बाद डेस्कन नोड के आस-पास की cells की वृद्धि हो नोटोकोर्ड का निर्माण धारण करती है।
- vii. सिफिलिड क्षेत्र में न्यूरोस प्लेट का अग्रे भाग डो-एम्निओन उदलानी है।




Fig :- 18 HOUR'S STAGE OF INCUBATION




FIG :- 21 HOUR'S STAGE OF INCUBATION

21 Hour's Stage of Incubation


Characteristics →

- i. नोटोकोर्ड व तार्निकीय गर्त सुविकसित होते हैं।
- आदि रैखा की मध्यजन वस्त्र cells पार्श्व दिशा में फैलना शुरू हो जाती हैं।
- उप सिंक्रैलिट कस बन जाता है।
- तार्निकीय गर्त टैसन नोट द्वारा आदिरैखा से पृथक् रहती हैं।
- प्लैसिडा सेत क्रूरिय व बाएन क्रूरिय सेत बनता है।
- एक नौटी क्रायिक वण्ड बन जाते हैं।
- आदि त्वां की cells के विकसन के कारण पूर्व भाग का निर्माण शुरू हो जाता है।


33 Hour's Stage of Incubation

Characteres →

- i. 13 જોડી ક્રામિક ચણક બન જાતી છે. [12 જોડી સ્પષ્ટ]
- ii. માર્સ્પિક - અગ્ર, મધ્ય વ પશ્ચ માર્સ્પિક મેં વિભક્તિ,
- iii. દુધન કા વિકાસ પ્રારંભ હો જાતી છે.
- iv. આંધિ રેખા ઘોસી હો જાતી છે.
- v. અગ્ર માર્સ્પિક મેં પાર્શ્વ કાર્ડિવર્સિ કો રૂપ મેં દુબ્ય જાણ્ય દિરખાઈ દેતી છે,
- vi. ક્રામિક ચણકો વ ત્રિભુજી નાલ કો મધ્ય નોટોકોર્ડ સ્પષ્ટ દિરખાઈ દેતી છે.



DIG:- 33 HOUR'S STAGE OF INCUBATION



DIG:- 48 HOUR'S STAGE OF INCUBATION

48 Hours Stage of Incubation

Characteristics →

- i. कार्मिक खण्ड के 28 जोड़े पाये जाते हैं।
- ii. सिर बायीं ओर मुड़ा हुआ दिखाई देता है।
- iii. अग्र सिर पर नखुरल दृश्य मिर्रेन लिक्वोरन झूत में मुड़ा जाती हैं, जिससे अग्र व पक्ष्य माल्तिष्क पास-2 में झा जाते हैं।
- iv. माल्तिष्क के पक्ष्य भाग में भी बल छकार का मुड़ाव आता है, जिससे शीघ्र आनमन कहते हैं।
- v. पैल्लियुसिडा स्क्रि में खवंधन जाल बढ़ जाता है।
- vi. आदि रेखा छोटी व अस्पष्ट हो जाती है।
- vii. श्रृणव आक्षय / ऑटोसिस्टर दिखाई देती है।
- viii. ऑप्टिक आक्षय क्रमशः ऑप्टिक कप व लेंस में विभेदित हो जाती है।

72 Hours Stage of Incubation

Characters →

i. 35 कार्यक वर्णन बन जाते हैं।

श्लेष्म के अग्र पक्ष अक्ष पर दैहिक टैठन की प्रक्रिया जारी रहने के कारण श्लेष्म पीतक के बायीं ओर विरपार देता है।

दाय कलिकाट स्पष्ट विरपार देती है।

पुच्छ कलिका भी बन जाती है।

हृदय में आलिङ्ग व निलय के बीच का स्फुटन गहरा हो जाता है व अतरो - आलिङ्ग पर का निर्माण शुरू हो जाता है।

वृष पट्टिकर चार मुख बन जाता है।

आरंभ पूर्ण विकसित हुक चषक व लेष करती है।

श्लेष्म माध्य नाशपाती के आकार के होते हैं।





FIG:- 72 HOUR'S STAGE OF INCUBATION



DIGI :- 96 HOURS STAGE OF INCUBATION

96 Hours of Stage of Incubation

Characters →

- i. पा क्रांतिक बण्ड पाये जाते हैं।
- ii. दैहिक एकल के फलस्वरूप सम्पूर्ण भ्रूण से छुमकुर पीतल पर अपनी बायीं दिशा में लेटा हुआ पाये जाते हैं।
- iii. दैह स्पर्श रूप में सिर, घड, व कुछ में विकसित होती है।
- iv. मास्तिष्क के विभिन्न सेंग स्वरूप दिवारि देने लगते हैं।
- v. संवैदी अंग विकसित देने लगते हैं।
- vi. हृदय के विभिन्न भाग भी विकसित होकर लै दिवारि देने हैं।
- vii. एम्नियोन व कॉरियोन पूर्ण विकसित हो जाते हैं।

Study of Fetal Membranes of Chick Embryo

झूठा कल्लाओं के आधार पर जंतुओं के दो समूहों में बांटा - ^{लाम्निओटा}
^{एनलाम्निओटा}
 प्रथम समूह के जंतुओं में झूठा कल्लाएं पायी जाती हैं। जैसे - पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी वगैरे जंतु।
 दूसरे समूह के जंतुओं में झूठा कल्लाएं नहीं पायी जाती, जैसे - मत्स्य वगैरे लम्फिविया के जलीय समूह।

मनुष्यों के झूठा के विकास के दौरान निम्न दो झूठा कल्लाएं पायी जाती हैं -

1. पीतक कोष / Yolk Sac → i. यह सबसे पहले बनने वाली झूठा बाह्य कल्ला है।

ii. एरिमा कोषिका की रूपरेखा (Mesoderm + Endoderm) पीतक पर फैल रही हुकु लीती है, यही पीतक कोष कहलाती है।

iii. इसका प्रमुख कार्य पीतक को अवशोषित कर विकासशील झूठा को पोषण प्रदान करना है।

2. लाम्निओन & कोरिओन / Amnion & Chorion →

i. उष्मायन के लगभग 30 घंटे की अवस्था में लाम्निओन का प्रथम स्केल मिलता है।

ii. यह सोमेटोडर्म (Ectoderm + Mesoderm) से बनती है।

iii. सोमेटोडर्म की बाह्य परत जिरने बाह्य की ओर Ectoderm व अंदर की ओर Mesoderm होती है, कोरिओन कहलाती है।

iv. एम्निओन व कोरियोन के बीच की गुहा को वीरियो-एम्निोटिक गुहा कहते हैं।


v. यह एम्निोटिक तरल बाधा आघातों से श्रूण को सा करने के लिए बाष्प-2 वरी सुरपने से भी बचाता है।

4. एलेंटोवस / Allantois →


i. यह श्रूणि सैत्र से विकसित होती है।

ii. यह स्क्लेकनोपुहरा को बनी होती है, जिरका समीपस्थ भाग श्रूणिय सैत्र में रहता है, और दूरस्थ भाग श्रूण देह से बाहर की ओर बहि करता है।

iii. यह छोटीन उपापचय से क्षण उत्सर्ज वगर्षों जेसे यूरिक व यूरिक अम्ल को बाह्योहित कर, श्रूण को वसके विषले उष्माप से बचाता है व उत्सर्जी भाग की तरह कार्य करता है।



DIG:- FULLY MATURED EXTRA-EMBRYONIC MEMBRANES OF CHICK



DIG : FROG - BLASTULA

Developmental Stages

1. Blastula

पिक्लन की 8 कोशिका अपरन्धा के समय ही एक गुद्दा बनने लगती हैं, जिसे क्लास्टोसील कहते हैं, जो मोरुला के बाप रूप में परिवर्तन देने लगती हैं। इसमें एक इन्ड्र मर। बढ़ता है, यह देखने में रपोरपली गैंग बन रहा।



वचना होती है। इसका आधार अपेक्षाकृत बड़ी पीतक cells - माइक्रोमियर्स का होता है। उपरी हिस्से पर छोटी cells - ब्लिन्ड माइक्रोमियर्स कहते हैं, होती हैं।

क्लास्टोसील सक्रिय रूप पर केंद्र से घटकर होती हैं। डारामिक क्लास्टोसील में क्लास्टोसील छोटी होती हैं, जिनका विभाजन क्लास्टोसील में यह अपेक्षाकृत बड़ी हो जाती है।


2. Gastrula

Characteristics →


- i. तीन जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है, इस समग्र भ्रूण त्रिरन्तरिय [Ecto, Mesod. Ando + derm] हो जाता है।
- ii. भ्रूण में Gastrulation (3) विधियों द्वारा होता है - अंतर्वर्तन, श्लेष्मिकरण, अणुरोपण।
- iii. सक्रिय श्रुत पर मेसेन्क्रिमियल तंत्र विष के फलस्वरूप इनकी संख्या बढ़ जाती है और यह अल्पक्रि श्रुत की मेसेन्क्रिमियल पर फैलकर दबान उत्पन्न करती है।
- iv. अंतर्वर्तन के सम्पान पर एक छिद्र बन जाता है, जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसके ऊपरी सिरे को पुच्छ और निचले छिद्र कहते हैं। यह वृद्धि का हुआ प्रमशः अर्धचंद्राकार प गोल होता है।
- v. पुच्छ और निचले छिद्र से cells अंदर क्लारिफिकली की ओर गमन करती हैं, यह श्लेष्मिकरण कहलाता है।
- vi. श्लेष्मिकरण के कारण क्लारिफिकली कम होती जाती है और माध्याम आकार में बढ़ जाती है व शनैः शनैः क्लारिफिकली समाप्त हो जाती है।




DIG:- FROG - DIFFERENT STAGES OF GASTRULATION



Neural Plate



Neural Folds



Neural tube

DIG:- DIFFERENT STAGES OF NEURULA

3. Neurulation

Neural tube जिससे brain & Spinal Chord बनते हैं, का निर्माण ~~Neurulation~~ कहलाता है और इस अवस्था में Neurula कहते हैं।

न्यूरोएक्टोडर्म मुख्य पृष्ठ वसतह पर नाक्षपाती संयोजन हो जाती है। यह न्यूरोल पट्टिका बनाती है। यह वृद्धि कर किनारे से कुछ ऊपर उठ जाती है, जिसे न्यूरोल फोल्ड कहते हैं। अब इसके मुख्य न्यूरोल खोंच बन जाती है। यह न्यूरोल खोंच न्यूरोल फोल्ड के बढने से गहरी हो जाती है, तो न्यूरोल ट्यूब बन जाती है।

इस अवस्था की कुछ घटनाएं निम्न हैं:-

- i. न्यूरोल एक्टोडर्म एपीडर्मल एक्टोडर्म से पृथक् हो जाती है व अंतर्वलयित होकर न्यूरोल ट्यूब बनाती है।
 - ii. एक्टोडर्म से क्रमशः क्रोडोमीजोडर्म व मीसोडर्म पृथक् हो जाती है।
 - iii. मीजोडर्म ③ भागों में विभक्त - A) एपीमीयर B) मीजोमीयर C) एन्डोमीयर
- एपीमीयर से क्रमशः डर्मिस, स्केलेरोटोम व मायोटोम बनते हैं। मीजोमीयर से जनन व उत्सर्जी अंग बनते हैं और एन्डोमीयर से कोलोम, हृदय वक्त्र coelom व वक्त्र पाइकाएं बनती है।


न्यूरोला के विकास की निम्न 3 अवस्थाएं -

- i. प्रारंभिक न्यूरोला / Early neurula → में न्यूरोल प्लैट लगभग जपटी बढती है। न्यूरोल फोल्ड बन जाते हैं लेकिन न्यूरोल खोंच नहीं बनती।
- ii. मध्य न्यूरोला / Mid neurula → फो न्यूरोल फोल्ड अवस्था भी कहते हैं। बलम न्यूरोल खोंच भी स्पष्ट हो जाती है।
- iii. पक्ष न्यूरोला / Late neurula → में न्यूरोल ट्यूब स्पष्ट बन जाती है।

4. Cleavage

निवेशन के लगभग $2\frac{1}{2}$ - 3 घंटे बाद ही विदलन शुरू हो जाता है, जो पूर्णभ्रंजी 5 पूर्ण होता है। प्रथम विदलन लम्बवत होता है, जिससे अण्डा 2 cells में बंट जाता है। तत्पश्चात् अण्डा 4, 8, 16, 32 cells में विभक्त हो जाता है। इसी पश्चात् 64, 128 cells बनती हैं।

तत्पश्चात् विदलन अनियमित हो जाते हैं। इस समय अण्डा श्राद्ध के फल की भाँति गुप्ता हुआ जलित होता है व यह समस्या "मोरूला" कहलती है। 32 cells वाली अपर्या से ही यह मोरूला कहलाने लगता है।



DIG:- DIFFERENT STAGES OF CLEAVAGE

Page No. :

Date :

Spates


Teacher Signature

Hardmanina (हर्डमैनिया)


<u>वर्गीकरण/Classification</u> →	
Phylum	- कोर्डेटा
Sub Phylum	- एग्रोनिकाटा
Class	- ऐरैकेडिलनिया
Family	- हर्डमैनिया
Genus	- हर्डमैनिया

लक्षण/Characters →

- i. यह एक स्तम्भी स्फूर्ति है, जो डचले पानी में पाया जाता है।
- ii. यह एक अक्षयलिंगी कोर्डेट है।
- iii. इसका शरीर गुलाबी रंग का होता है।
- iv. यह लगभग 0.5 cm लम्बा, 7 cm चौड़ा व 4 cm मोटा होता है।
- v. हर्डमैनिया एक फिल्टर फिडर है, जिसका अर्थ है, कि यह पानी को छानकर खाने ग्रहण करता है।



DIG:-HERDMANIA PALLIDA EXTERNAL FEATURES



DIG :- OIKOPIEURA

ओइकोप्लेउरा (Oikopleura)

वर्गीकरण/Classification →

Phylum	-	कूर्डेटा
Sub Phylum	-	प्लेनोट्रोचा
Class	-	एपेंडिकुलरिया
Genus	-	ओइकोप्लेउरा

लक्षण/Characters →


- i. यह छोटे, पेलैजिक जीव हैं, जो दुनिया के अधिकांश महासागरों में पाये जाते हैं।
- ii. ये टेडपोल जैसे दिखते हैं।
- iii. इनके जीवन काण्ड जगत में सबसे छोटे हैं।
- iv. इनकी कुछ उजातियां वायोल्यूमिनसेंट होती हैं।
- v. यह एक महत्वपूर्ण स्तब्धो वर्ग योगदानकर्ता हैं।

एसिडिया (Ascidia)


वर्गीकरण / Classification →	Phylum	-	ऑर्डेटा
	Sub-Phylum	-	थ्रैकोस्टीटा
	Class	-	एस्किडोसिया
	Order	-	एस्किडोमोना
	Genus	-	एस्किडिया

Characters →

- i. यह एकल रज्ज्वानवृद्ध उबले रतमुझी जल में पाया जाता है।
- ii. यह वनधारणतया रतमुझी रूकपट्ट कटलाता है।
- iii. शरीर बेलनाकार 10-12 cm लम्बा होता है।
- iv. यकृत का अश्राव व हृदय नलिकाकार होता है।
- v. आमाशक फूला हुआ व आंत वलय / लुप्य लुमा होती है।



DIG:- ASCIDIA



DIG:- BOTRYIUS

बोट्रिलस (Botryllus)

वर्गीकरण / Classification →

Phylum	-	सुईटा
Sub-phylum	-	थूरोकोइटा
Class	-	एलिडिएसिया
Order	-	एलिडिए कुम्पोजिटी
Genus	-	बोट्रिलस

लक्षण / Characters →



- i. यह निपटी जंतु समुद्र में चट्टानों, घाटों, खम्बों / लकड़ों की तली जैसे आधार से बोलबोल रहता है अतः स्थानबद्ध जंतु है।
- ii. शरीर में एन्टीगमेटा / क्लोनम वंश आयताकार होते हैं।
- iii. पृष्ठ पटल पर में बिल्लिकाएँ नहीं पायी जाती हैं।
- iv. यह अटलांटिक व मेडिटरेनियन समुद्र में पाया जाता है।
- v. ये डम्पसिंगी होते हैं।

पेट्रोमाइजॉन (Pteromyzom)


वर्गीकरण / Classification	→	Phylum	- कोर्डेटा
		Group	- क्रेनिएटा
		Sub-Phylum	- एग्नेवा
		Class	- स्नाइवली र-ट्रिंगेटा
		Order	- पेट्रोमाइजॉइडिया
		Genus	- पेट्रोमाइजॉन मेरीनस

लक्षण / Characters →

- गह वनस्पती व स-पञ्च जल दोनों में पाया जाता है। इसके साधारणतः लैंग्ये छद्मे
- ये मछलियों पर बाह्य परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं।
- त्वचा में श्चको का अक्षम होता है।
- नात्रा छिद्र के पिछे विनियत काय पायी जाती है।
- नर व मादा अलग-अलग होते हैं।



DIG :- PETROMYZON



DIG:- MYXINE

मिक्ससिन (Myxine)

वर्गीकरण/Classification	Phylum	-	कोर्डेटा
	Group	-	क्रिनिडेटा
	Sub-Phylum	-	एग्नैथ्या
	Class	-	साइक्लोरिन्टोमेटा
	Order	-	मिक्सिनोबॉडिया
	Genus	-	मिक्ससिन / डेलोरिन्टोमा

लक्षण/Characters



- ये समुद्री जल की तली में पड़ी हुई अवस्था में पायी जाती हैं।
- इन्हें स्थायारणतः हैंग - फिश कहते हैं।
- हारीर लम्बा, बेलनाकार बलि के समान लगभग 45-60 cm लम्बा होता है।
- त्वचा चिकनी व झलक रहित होती है।
- मुख के पार्श्व में 4 जोड़ी संवेदी मूर्ति रूपाक्षीक पाये जाते हैं।

अमोसीट लारवा (Ammocoete Larva)

वर्गीकरण / Classification →	Phylum	-	कोर्डेटा
	Group	-	क्रैनिेटा
	Sub-Phylum	-	लैम्बेन्का
	Class	-	साइक्लोस्टोमेटा
	Order	-	पेट्रामाइनोइडिया
	Genus	-	अमोसीट लारवा


लक्षण / Characters →

- कुपल स्वच्छ जल में पाया जाता है, जो पेट्रामाइनॉन का लारवा है।
- नैन पर नैन पैरियाँ व देह पर बमोरी लम्बा पायी जाती है।
- शरीर की अथर स्तम्भ पर एक्जोस्टराक पायी जाती है।
- यह शीवाल व जीवाणुओं का भक्षण करता है।
- लारवा अवस्था 3-4 वर्ष की होती है, परंतु कुछ जातियों में यह अवस्था 7 वर्ष की जाती है।



DIG:- AMMOCOETE - LARVA

Teacher Signature



DIG :- TORPEDO

टॉरपीडो (Torpedo)

<u>वर्गीकरण</u> / Classification →	Phylum	- कोर्डेटा
	Group	- क्रेनिएटा
	Sub-Phylum	- नेम्योस्टोमेटा
	Class	- कोडिक्वॉल
	Order	- ट्राइपोट्रिमेटा
	Genus	- टॉरपीडो
	Species	- प्रिसीज

लक्षण / Characters →


- यह समुद्री जल में पैरों पर पायी जाती है व मरुहारी मछली है।
- आधारतः इसे विद्युत-रै कहते हैं।
- सिर पर अंश परवो के बीच में एक जोड़ी विद्युत अंग पाये जाते हैं।
- आंखें व क्लोम वंश पृष्ठ सतह पर पाये जाते हैं।
- मुख व क्लोम छिद्र अथर सतह पर पाये जाते हैं।

काइमिरा (Chimaera)


वर्गीकरण / Classification →	Phylum	-	चोर्डेटा
	Group	-	क्रोमिडेटा
	Sub-Phylum	-	नेथीरुस्टेरोमेटा
	Super-Class	-	पिसीज
	Class	-	होमोसैकेलर
	Order	-	कार्बोमेरीफोर्मिस
	Genus	-	काइमिरा

लक्षण / Characters →

- i. यह समुद्री जल में पायी जाने वाली मछली है। यह अकईरुविको व समुद्री जल में
का श्वसन करती है।
- ii. इसे खाद्यस्रोत: मछली / डेरिंग्स का राजा / पैत शाक भी कहते हैं।
- iii. शरीर लम्बा 60 cm लम्बा वनस्पति व ऊँचे लड़के युक्त होता है।
- iv. आंखों में बर्षिकाकार कपाट पाया जाता है।
- v. पार्श्व बैरवा तंत्र शुली बर्षिका के रूप में पायी जाती है।



DIG :- CHIMAERA



DIG :- LEBEO

लेबिओ (Labio)

वर्गीकरण / Classification →	Phylum	-	कॉर्डेटा
	Group	-	क्रैनिस्टा
	Sub-Phylum	-	नेच्योरॉमीटा
	Super Class	-	पिसीज
	Class	-	ऑस्ट्रियीज
	Order	-	साम्पिनीफ़ॉर्मिज
	Genus	-	लेबिओ

लक्षण / Characters →

- अष्ट स्पर्शक जलिय वनोत सील व नदिमें में पाया जाता है।
- इसे सामान्यतः शरतिर रोडू छेदे है।
- देह का रंग चाँदी समान नीले, पल्ले व लाल छाप भुक्त होत है।
- पार्श्व शिरा स्पष्ट होती है।
- सिर के पिछे बड़ा छाच्छद पाया जाता है, जो 4 जोड़ी गिल्स को ढके बरवत है।


एन्गुइला (Anguilla)

वर्गीकरण/Classification →


Phylum	- कोर्डेटा
Super Class	- पिसीज
Class	- क्लास्सिफाइज
Order	- एन्गुइलाकारिया
Genus	- एन्गुइला

लक्षण/Characters →

- i. यह स्क्वैड जल में पायी जाने वाली मछली है, जो समुद्राभिगामी होती है।
- ii. इसे स्नायानतः सर्प मीन / ईल के नाम से जाना जाता है।
- iii. शरीर लम्बा, पतला, कुबला पतला सर्प की तरह घिसनाकार होता है।
- iv. पंखों में परंप अर्रे पायी जाती है।
- v. गिल छिद्र छिद्र होते हैं व ओपरकुलम द्वारा ढके होते हैं।



DIG :- ANGUILLA



DIG:- HIPPOCAMPUS

हिप्पोकेम्पस (Hippocampus)

वर्गीकरण / Classification	→	Phylum	-	कोर्डेटा
		Sub-Phylum	-	गनेथोस्टोमेटा
		Super Class	-	पिसीज
		Class	-	ऑस्ट्रिन्थीज
		Order	-	सिन्थेफीकोमर्जि
		Genus	-	हिप्पोकेम्पस

लक्षण / Characters →


- i. यह जंतु समुद्र तल में दृढ़ परंतु की सहजता से उद्योधि अवस्था में तैरता पाया जाता है।
- ii. इस मछली का सिर पृष्ठीय छोटे से सिर पृष्ठीय के समानता रखता है।
- iii. जबड़े उभय में परिवर्तित होकर सिर के भाग बनते हैं।
- iv. अज्ञा परंतु हार्सिन व ऑपरकुलम के पिछे स्थित होते हैं।
- v. मध्य परंतु में केवल, छोटा पृष्ठीय परंतु पाया जाता है।

एकीनीस (Echinoids)


वर्गीकरण/Classification →	Phylum	- कूर्डेटा
	Sub-Phylum	- नैचोरेमिटा
	Super Class	- पिस्सीज
	Class	- ऑर्गस्मिथीज
	Order	- डिस्कोस्मिफेली
	Genus	- एकीनीस/रेमोर।

लक्षण/Characteristics →

- i. यह उल्लङ्घितवांछीय व गर्म समुद्रों में पायी जाती है।
- ii. इसका स्थायकत्व: भूकम्प मरुती भी उधरे हैं।
- iii. वातावरण अनुकूल होता है।
- iv. कुछ समपाशित होती हैं।
- v. यह इंग्लैण्ड के दूर किनारे, हिंद महासागर, अटलांटिक व भूमध्य सागरों में पायी जाती है।



DIG :- ECHENEIS



DIG :- FLAT FISH

(Flat - Fish)

Classification/वर्गीकरण →	Phylum -	कोर्डेटा
	Sub Phylum -	नेवोस्टोमेटा
	Super Class -	पेरीज़
	Class -	ऑस्टिक्थीज़
	Order -	प्लुरीनेक्टोमोर्फिस
	Genus -	प्लुरीनेक्टस

लक्षण/Characters →

- i. यह समुद्री जल के तल में रहने से मिले अनुकूलित होती हैं।
- ii. शरीर आकारगत: चपटी मछली कहते हैं।
- iii. शीर्ष असममित होता है।
- iv. दोनों आँखें झंर की ओर स्थित होती हैं।
- v. त्वरक में वाताशय अनुप।


શાલ્કપિચી મીસ (Ichthophis)

વર્ગીકરણ/Classification →


Phylum	-	કોર્ડેટા
Sub-Phylum	-	નેબોર-દ્વેમિટા
Super Class	-	લમ્ફીચીયા
Class	-	લમ્ફીચીયા
Order	-	લ્થોડા
Genus	-	શાલ્કપિચી મીસ

લક્ષણ/Characters →

- i. પ્રદ પાવદિન ઉદ્ભવ્ય નતે, નમ સ્પષ્ટો મેં વિલ લનાકર રદતા હૈ.
- ii. હસે સામાન્યતઃ ઢાંચે કુમિ/લીલિલિયા, મી લુદતે હૈ.
- iii. લેદ 6-9 inch લમ્બી કુમિ લમાન કુલિલ પ લેલનાકર હોતી હૈ.
- iv. સિર છોટા વ ડાગો સે કા રદતા હૈ.
- v. પાવ વ મેરપલાલં અલ્બ હોતી હૈ.



DIG:- ICHTHOPHIS



DIG :- SALAMANDER

बैलमिंडर (Salamanders)

वर्गीकरण / Classification →	Phylum - कॉर्डेटा
	Class - एम्फिबिया
	Order - यूरोडेला
	Genus - बैलमिंडर

लक्षण / Characters →


- i. यह उभयचर प्राणि हैं।
- ii. छिपकली जैसे दिरले वलि पुनले शरीर, कुदं वूषुन, छोटे अंग व लार्वा व अरु दोनो अपर्याजो में पूछ छे लिह जाले जाते हैं।
- iii. इनको लम्बा चिकनी व नम होती है।
- iv. इनमें श्वाक / पंजे अनुप।
- v. त्रे मांसाहारी होते हैं।

हाइला (Hyla)


वर्गीकरण/Classification	→	Phylum	-	छोर्टा
		Super Class	-	टेइपिडा
		Class	-	एम्फीबिया
		Order	-	लेम्बुरा
		Genus	-	हाइला

लक्षण/Characters →

- यह पेड़ों व चट्टानों पर पाया जाता है। (बसका स्वभाव "पृथ्वीवासी" होता है।)
- इसके साधारणतः पृश्नमयी मेंढ़क उद्यते हैं।
- छाया का रंग हरा/भूरा होता है।
- छेपल ऊपरी जबड़े में दांत होते हैं।
- ऊपर की त्वचा पर नमी सोखने वाली ग्रंथियाँ पायी जाती हैं।



DIG :- HYL



DIG :- RANA

राणा (Rana)

<u>वर्गीकरण</u> / Classification →	Phylum	- कॉर्डेटा
	Class	- एम्फिबिया
	Order	- रंजीव
	Genus	- राणा

लक्षण / Characters →

- i. इसकी लम्बाई 12-20 cm हो सकती है।
- ii. इनकी त्वचा चिकनी, नम व फिसलनदार होती है।
- iii. इनका सिर शंक्वाकार व ध्वनन कुंड होता है।
- iv. अग्रपादों में 4 अंगुलिया व नरों में मेथून-पेंड होते हैं।
- v. मादाएं नरों की तुलना में भारी व लम्बी होती हैं।


टेस्ट्यूडो (Testudo)

वर्गीकरण/Classification →


Phylum	- कोर्डेटा
Sub-Phylum	- नेफेरोकोर्मीटा
Class	- रेप्टीलिया
Order	- किलोनिया
Genus	- टेस्ट्यूडो

लक्षण/Characters →

- i. यह स्थायी दिन भर जागृत है, जो हमीमो व हिरो का भक्षण करता है।
- ii. इसके स्नायुवाहन: स्थायी कुछ आ कटते हैं।
- iii. बारीक कठोर कवच में बंधे होता है।
- iv. किरपिन उतल व ललाटोत्तम सुविडमित शब्दों से बने होते हैं।
- v. शीर्ष, गर्दन, पाद व पुच्छ शब्दों से ढके रहते हैं।



DIG:- TESTUDO



DIG :- CHELONE

कीलोन (Chelon)

वर्गीकरण/Classification →

Phylum	- कोर्डेटा
Sub phylum	- नेपोर-होमेट
Class	- रेप्टिलिया
Order	- किलोनिया
Genus	- कीलोन

लक्षण/Characters →


- i. यह वनस्पति जंतु है, शाकाहारी होता है व खोपान का अंशण करता है।
- ii. ऊपरी व नीचले जबड़े चोंचनुमा व दाँतों युक्त होते हैं।
- iii. गीवा लम्बी होती है, जो छेरापेस में पुर्णतः छिप नहीं जाती।
- iv. पृष्ठ छोटी होती है।
- v. यह जंतु समुद्र के किनारे मिट्टी में अण्डे देते हैं।

जल कछुआ (Fresh water - Tortoise)


वर्गीकरण/Classification →	Phylum	-	कॉर्डेटा
	Sub Phylum	-	प्लीसिटा
	Class	-	रेप्टीलिया
	Order	-	किलोनिया
	Genus	-	टेस्टुडिना

लक्षण/Characters →

- i. यह भारत, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका (मिस्र) व जलवा दीपसमूह में आशियाई रूप से मिलता है।
- ii. यह एक स्फुट जलिय व तालाब का सामान्य रेप्टिल है।
- iii. पृष्ठ अतट ऊपर से जैतूनी और नीचे से पीला है।
- iv. मोष्ठ मौल होता है।
- v. भ्रूणी चोच का अभाव होता है।



DIG :- TORTOISE



DIAG:- DRACO

રેકો (Draco)

વર્ગીકરણ (Classification) →	Phylum	- કોર્ડેટા
	Sub phylum	- ચેલોન્ટોમોર્ફા
	Class	- લેપ્ટોસિયા
	Order	- ડ્રેકોનિડે
	Genus	- રેકો

લક્ષણ / Characters →


- i. ગ્રંથ પૃષ્ઠો પર રહેતી છે. કમ્બી-૨ લેબીલે મૂમ પર આતી છે.
- ii. રાત્રે હજાર છિપકલી મી કદતે છે. ભારતિય જાતિ છે. વોલ્ફસ છે.
- iii. જિંઘડા ઘોરી વ મોરી દોતી છે.
- iv. વૃક્ષોરુકાં અગ્રગામી દોતી છે.
- v. છત્વસ - પરિવર્ધન.

केमेलिऑन (Chamaeleon)


वर्गीकरण/Classification	→	Phylum	-	चोर्डेटा
		Sub-phylum	-	नेपोरहोमेटा
		Class	-	रेप्टीलिया
		Order	-	र-वपेरोटा
		Genus	-	केमेलिऑन

लक्षण/Characters →

- i. यह एक घुसवासी छिपकली है।
- ii. यह कीटभक्षी होती है।
- iii. पुंछ लम्बी व परिग्रही होती है।
- iv. फेफड़ा में वायुकोष चये जाते हैं।
- v. आँखें बड़ी होती हैं व गोली ग्रामिन पलकें द्वारा ढकी व हलती हैं।



DIG :- CHAMAELEON



DIG:- ERYX

एरिक्स (Eriks)

<u>वर्गीकरण</u> / Classification →	Phylum - कोर्डेटा
	Sub-Phylum - नेचोस्टोमेटा
	Class - रेप्टीलिया
	Order - स्क्वामेटा
	Genus - एरिक्स

लक्षण / Characters →

- यह मुख्यतः मरुस्थलिय क्षेत्रों में घिया पाया जाता है।
- यह छिपकली, मेंढक व जूँट बघाता है।
- इसि साधारणतः कुमुदी सापे / सेण्ड बोआ कहते हैं।
- यह एक विषहिन अघातकारक स्तव है।
- कुछ का वक्ष छोरा मोरा सिर नुमा होता है।


नाजा (Naja)

वर्गीकरण (Classification) →


Phylum	- chordata
Sub Phylum	- nepheromorph
Class	- reptilia
Order	- squamata
Genus	- Naja

लक्षण/Characteristics →

- i. यह काले रंग का पिछला सर्प है, जो मिट्टी में बिल बनाकर रहता है।
- ii. यह नागा/कौबरा के नाम से जाना जाता है।
- iii. यह काले-भूरे रंग की सामान्य लंब 6 ft तक होती है।
- iv. यह दिनचर जल पत्तों के नीचे वनस्पति के निचले बिलों में रहता है।
- v. यह ऊँचे देता है मादा एक बार में 6 अंडे देती है।



DIG :- NAJA



DIG :- VIPER

वाइपर (Viper)

वर्गीकरण / Classification →	Phylum	-	ऑर्डेटा
	Sub phylum	-	नेबोरोन्टोमेटा
	Class	-	रेप्टीलिया
	Order	-	स्कैमेटा
	Genus	-	वाइपर

लक्षण / Characters →

- यह मृदुली व साँझों वाले उद्देश में पाया जाता है।
- इसे साधारणतः डोबिया सर्प / घोरण कहते हैं।
- यह विषेला सर्प है व गर्तदिन वाइपर के नाम से जाना जाता है।
- द्वारीर मोटा लगभग 1.5 - 2m लम्बा होता है।
- यह यूरोप, एशिया, सीलोन, अफ्रीका आदि में पाया जाता है।


क्रोकोडिलस (Crocodilus)

वर्गीकरण/Classification →


Phylum	-
Sub-Phylum	-
Class	-
Order	-
Genus	-

लक्षण/Characteristics →

- i. यह नदियों व झीलों में रहने वाला मांसाहारी जंतु है, जो स्थल पर भी रह सकता है।
- ii. यह लम्बी, बड़े चूर्मायि जालों व पैरों से ढकी होती है व 4-6m तक लम्बी हो सकती है।
- iii. जीभ बचपटी, मोटी व बाहर निकलने वाली नहीं होती।
- iv. यह मांसाहारी जंतु है, जो छोड़कीये का भक्षण करता है।
- v. नर में एक विशेषण होता है। मादा सड़े अफ्री खुंसा में घोंसला बनाकर देती है व उनकी रक्षा करती है।



DIG :- CROCODILUS



DIG:- PAVO CRISTATUS

पैवो क्रिस्टेटस (Pavo Cristatus) / मयूर

वर्गीकरण/Classification →	Phylum -	कोर्डेटा
	Sub phylum -	नेचोस्टोमेरा
	Class -	एपिज
	Order -	गेलीफार्मिज
	Genus -	पैवो क्रिस्टेटस

लक्षण/Characters →


- i. यह घने झाड़ीदार जंगलों में पाया जाता है, जहाँ जल स्त्रोत उपलब्ध हो।
- ii. इसे साधारणतः मोर / मयूर कहते हैं।
- iii. भारत का यह राष्ट्रीय पक्षी है।
- iv. पाद दोड़ने व स्वरूपन के लिए उपयुक्त होते हैं।
- v. यह समुद्र में रहता है। लड़कियों में लड़क नर व 4-5 मादाएँ होती हैं।

कोरिओरिस (Choriotis)


वर्गीकरण/Classification - Phylum - कोर्डेटा
 Sub-Phylum - नेचोरोसोमेटा
 Class - एपीज
 Order - गुडफार्मिड
 Genus - कोरिओरिस

लक्षण/Characters →

- i. यह घास, झाड़, या झरवांडू वाले खुले व खेती वाले क्षेत्रों में जहां जल उपलब्ध हो, पाया जाता है।
- ii. इसे राजस्थान में राज्य वसी का दर्जा प्राप्त है।
- iii. यह समूह में रहता है, जिसमें 2-3 व्यक्ति होते हैं।
- iv. बगड़ी चिड़िया लगभग 4 ft ऊंचे बढ़ती है।
- v. वलक भार 8-14 kg होता है।



DIG :- CHORIOTIS



DIG:- COLUMBA

कोलंबा (Columba)

वर्गीकरण/Classification →	Phylum -	कोर्डेटा
	Class -	एवीज
	Order -	कोलंबिफॉर्मिस
	Genus -	कोलंबा

लक्षण/Characters →


- i. उड़ान के लिए अनुकूलित एक सुव्यवस्थित शरीर, बन्धुबन्धों की गर्दन व पंखों परों के बसाए एक नीला-भूरा शरीर व अलग-2 काले पंख पट्टियों द्वारा पहचाने जाते हैं।
- ii. इनके पास छल्ले के पंख पर दो अलग-2 काली पट्टियाँ होती हैं।
- iii. एक गहरे-भूरे गुलाबी चोंच के साथ एक हल्के भूरे रंग का पंख होता है।
- iv. इनकी नारंगी / लाल आँखें होती हैं।

मैमिस (Manis)


वर्गीकरण/Classification →	Phylum	-	चुईटा
	Sub-Phylum	-	गुनेथोस्टोमेटा
	Class	-	मैमेलिया
	Order	-	मोमिडोटा
	Genus	-	मैमिस

लक्षण/Characters →

- यह पछडी सैंगो में पाया जाने वाला रात्रिचर व बिभकारी प्राणी है।
- इसे सामान्यतः बालू की चिटी खोर / पैगोमिन भी कहते हैं।
- थैचीटियो व दिमफो का भक्षण करता है।
- खिर पर लुकिम लुग / व्यूंपन पाया जाता है।
- नेत्र व कर्ण पल्लव छोटे होते हैं।



DIG :- MANIS



DIG:- SMALL BAT

छोटी चमगादड़ (Small Bat)

वर्गीकरण/Classification →	Phylum -	कॉर्डेटा
	Sub Phylum -	पृष्ठत्रिटा
	Class -	मैमेलिया
	Order -	मॉस्फिफेरा काराचैरा
Type Genus	-	बैट छोटी चमगादड़

लक्षण/Characters →


- i. विश्वव्यापी छोटी कीट-भक्षी चमगादड़ों की अनेक जातियां होती हैं,
- ii. ये रात्रिचर होते हैं,
- iii. नैत्र अप्रभु होते हैं, किंतु श्रवण उपकरण अत्यंत विकसित,
- iv. अग्रपाद की पंखली झुगुली पर नरफर होते हैं,
- v. इनकी वीरु मर्यादित मल गुच्छनों से युक्त होता है।

કંગારુ (Kangaroo)


વર્ગીકરણ / Classification →	Phylum	- કોર્ડેટા
	Class	- મેમલિયા
	Order	- ડિસીડોથોરિયા
	Genus	- મેક્રોપસ

લક્ષણ / Characters →

- યદ દબલને - છૂદને કૃત્રિમ અનુકૂળિત થોતે હૈં
- સંતુલન કે લિદ રજકે પાસ લક લમ્બી માંસલ વૂછ થી હોતી હૈં
- કંગારુઓ કા સિર છોટા વ કાન અપેશાકન વડે વ ગોલ હોતે હૈં
- માપા કંગારુઓ કે પાસ લક બેલી હોતી હૈં; જિસમે વે અપને બચ્ચો કા પાલન - પોષણ કરતી હૈં



DIG :- KANGAROO



DIG:- ORNITHORHYNCHUS

ऑरनिथोरिफ़स (Ornithorhynchus)

वर्गीकरण / Classification →	Phylum	-	कोर्डेटा
	Sub Phylum	-	नेथोर-रोमिटा
	Class	-	मैमेलिया
	Order	-	मोनोट्रिमाटा
	Genus	-	ऑरनिथोरिफ़स

लक्षण / Characters →

- i. श्च नदियों, झीलों व तालाबों में पाया जाता है।
- ii. श्चोंके छोटी होती हैं व इन पर निम्नलिखित पटल पायी जाती हैं।
- iii. पूँछ चपटी व चप्पू के समान होती हैं जो तैरने में सहायक होती हैं।
- iv. वृषण उदरिय होते हैं।
- v. मादा में गर्भाशय व योनि का अभाव होता है।



R. K. GROUP OF COLLEGE
BEHIND KALWAR POLICE STATION, KALWAR, JAIPUR (RAJ.)