



R. K. GROUP OF COLLEGE

BEHIND KALWAR POLICE STATION, KALWAR, JAIPUR (RAJ.)

Zoology



CERTIFICATE

Name: Anita choudhary

Class: B.Sc V Sem.

Roll No.:

Exam No.:

Institution R.K. P.G. College, Kaluwar

This is certified to be the bonafide work of the student in the

_____ Laboratory during the academic
year 20 ____ /20 ____

No of practicals certified _____ out of _____ in the
subject of _____

.....
Teacher in-charge

.....
Examiner's Signature

.....
Principal

Date :

institution Rubber stamp

INDEX

S. No.	Name of Experiment	Page No.	Date of Experiment	Date of Submission	Remarks
1	Counting of RBCs and WBCs using haemocytometer				
2	Estimation of hemoglobin by Sahli's haemometer				
3	Estimation of haematocrit value (PCV)				
4	Demonstration of enzyme activity (Catalase) in the liver				
5	Study the effect of pH and temperature on salivary amylase activity.				
6	Detection of proteins in the animal tissue/food samples.				
7	Detection of Carbohydrates in the animal tissue/food sample				

उद्देश्य :- Counting of Red and white Blood Corpuscles in a Blood sample.

Principle :- रक्त तथा उसमें उपस्थित कणिकाओं के कार्य एवं महत्व से आप पूर्व-परिचित हैं। रक्त कणिकाओं की संख्या में किसी भी प्रकार की अभावनिक वृद्धि अथवा कमी रोग का चिह्न होती है।


सामग्री :- 1. कांचभांड तथा उपकरण - हीमोसाइटोमीटर
2. रसायन - हाइड्रोजन-पेरऑक्साइड, बिबर, एल्कीहॉल।
3. परीक्षण सामग्री - स्तनी का रक्त।

विधि :- हीमोसाइटोमीटर :- इस उपकरण में 2 तनुकारी नलिकाएँ तथा एक हीमोसाइटोमीटर होता है जिस नलिका में लाल रंग की मणिका तथा 10 अंकित होता है वह RBC नलिका है। दूसरी नलिका जिसमें ड्रैफ्ट मणिका तथा 11 अंकित होता है वह WBC नलिका है। हीमोसाइटोमीटर एक मीटी स्लाइड के रूप में होता है इसके मध्य में दो प्रकार के गणन-कक्ष बने होते हैं।

1. RBC (लाल रक्त कणिकाओं) का आकलन :-

(i) हीमोसाइटोमीटर - स्लाइड तथा कवर-ग्लास को आसुत जल से धोकर सुखाए। RBC नलिका को पहले हाइड्रोजन-पेरऑक्साइड फिर एल्कीहॉल तथा अन्त में बिबर से साफ करते हैं तथा पूरी तरह सुखाते हैं।

(ii) रक्त की नलिका में लेते हैं। वृत्तिका-क्रिया द्वारा रक्त नलिका में चढ़नी लगाता है। आवश्यकतानुसार



dig - RBC नलिका

- घीरे से खींच कर रक्त की नलिका पर लगने 0.5 अंक पर ले जाते हैं, फिल्टर पेपर की सहायता से नलिका के बाहरी भाग को पीछे कर साफ कर लेते हैं। अब नलिका में हैमर - चील खींचते हैं जिससे (iii) सम्पूर्ण चील ठीक 101 अंक तक पहुँच जाए नलिका में उपस्थित रक्त अब 200 गुणा तनुकृत दृष्टा में है। (iv) हल्की सी फुँक लगाकर नलिका के वैक्यूम - नली वाले भाग से तनुकृत रक्त निकाल देते हैं। (v) हीमोसाइटोमीटर लेकर उसमें गणन - कक्ष पर कवर-स्लिप रख देते हैं। (vi) हीमोसाइटोमीटर की सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर केन्द्रीय, वर्ग mm वर्ग को फोकस करते हैं।

(vii) गणन :-

- (i) रक्त को 200 गुणा तनुकृत किया गया था, अब अँसत राशि को 200 गुणा किया जाता है।
(ii) क्योंकि गणन - कक्ष 0.1 mm गहरा होता है, अतः RBC की अँसत राशि को 10 से भी गुणा किया जाता है।
(iii) क्योंकि गणन - कक्ष के 1/25 भाग में ही की गई थी, इसलिए RBC की अँसत राशि को 25 से भी गुणा किया जाएगा।

- (iv) अतः किसी जंतु के रक्त में RBC के आकलन के लिए निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग करते हैं -

1 घन मिमी में RBC की सं. = RBC की अँसत राशि $\times 200 \times 10 \times 25$
उदाहरणार्थ, यदि गणन - कक्ष के 5 उपवर्गों में गिनी गई RBC की अँसत राशि 98 है, तब 1 घन mm में RBC की राशि होगी = $98 \times 200 \times 10 \times 25$

$$= 98 \times 50,000$$

$$= 4,90,000 = 4.9 \times 10^6 / \text{घन मिमी}$$

$$= 4.9 \text{ करोड़ प्रतिघन मिमी}$$

2. WBC

कुल वि

मी RBC

(i) हीमॉ

जल

हाउ ड्रीज

ट्रिपर स

सुखाती

(ii) रक्त

बलि

कीटि

अ

(iii) जि

पहुँच

(iv) ह

पाल

ही

(v) क

(vi) ह

गोन

वगी

(vii) ह

गोन

वगी

(viii) ह

गोन

वगी

(ix) ह

गोन

वगी

(x) ह

गोन

वगी

(xi) ह

गोन

वगी

(xii) ह

गोन

वगी

(xiii) ह


गोन

वगी

(xiv) ह

गोन

वगी



white
bead

1.1

1.0

0.5

WBC नलिका

2. WBC (रक्त कणिकाओं का आंकलन) -

कुछ विशेष अन्तरी की छीड़कर WBC का आंकलन भी RBC के आंकलन के समान ही किया जाता है।

हीमोसाइटोमीटर - स्लाइड तथा कवर - स्लिप की आसुत-

(i) जल से धीकर सुखाते हैं। WBC नलिका की पट्टी हाइड्रोजन - परऑक्साइड, फिर एंकीडॉल तथा अन्त में बिबर से धीकर साफ करते हैं तथा फिर पूरी तरह सुखाते हैं।

(ii) रक्त की नलिका में लेते हैं। कैथिका - क्रिया द्वारा रक्त नलिका में चढ़ने लगेगा। आवश्यकतानुसार रक्त की

धीरे से खींचकर नलिका पर लगी 0.5 अंक तक ले जाए

अब इस नलिका में WBC तनुकारी - तरल खींचते हैं।

(iii) जिससे सम्पूर्ण धील नलिका पर लगी अंक 11 तक पहुँच जाता है। यह रक्त 20 गुना तनुकृत द्रव्य में है।

(iv) हल्की - सी फुँक लगाकर नलिका के कैथिका - नली वाले भाग से कुछ तनुकृत रक्त बाहर निकाल दें।

(v) हीमोसाइटोमीटर - स्लाइड लेकर उसके गणन - कक्ष पर कवर - ग्लास रखते हैं।

(vi) हीमोसाइटोमीटर की सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर गणन - कक्ष की फोकस करते हैं। कोर्न के 4 बाहरी वर्गों (1 वर्ग mm) में WBC की संख्या जात करते हैं।

(vii) गणन -


(a) रक्त की तनुकृत क्रिया गया था, अतः औसत राशि की 20 से गुणा किया जाता है।

(b) क्योंकि गणन - कक्ष 0.1 mm गहरा होता है, अतः WBC की औसत राशि की 10 से भी गुणा किया जाएगा।


(c) अतः किसी जंतु के रक्त में WBC के आंकलन के लिए निम्नलिखित समीकरण का समीक्षा किया जाता है:

Counting Chamber

Cover slip



Cover slip



टीमीसाइटीमीटर A. ऊपरी दृश्य
B. पार्श्व दृश्य

1, वन mm में WBC की संख्या = WBC की गिनी हुई
 औसत राशि $\times 20 \times 10 \times 1$
 उदाहरणार्थ, यदि किसी जंतु के, WBC की औसत राशि 35 है तब
 होगी = 35×200

$$= 7,000 / \text{वन मिमी} = 7.0 \times 10^3 / \text{वन मिमी} \text{ ।}$$

परिणाम :- इस प्रयोग में RBC की संख्या = 49
 तथा WBC की $7.0 \times 10^3 / \text{वन mm}$ है।

Teacher's Signature.....

उद्देश्य - Estimation of hemoglobin by Sahli's haemometer

प्रायोगिक सामग्री - हीमोग्लोबिनोमीटर, N/10 HCl
हीमोग्लोबिन पिपेट, आसुत जल, सोडियम नाइट्रेट

सिद्धान्त :- HCl की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन अम्लीय हीमेटिन में बदल जाता है जिसके कारण विलयन का रंग भूरा ही जाता है इस भूरे रंग का मिलान मानक विलयन से किया जाता है।

हीमोग्लोबिनोमीटर :- इसमें दो लंबी कांच की बंद ट्यूब होती हैं जिनमें भूरे रंग का मानक भरा होता है। मध्य भाग में अंकित हीमोग्लोबिन ट्यूब की रखनी का स्थान होता है।

विधि :- 1. हीमोग्लोबिनोमीटर व पाश्चर पिपेट की भलीभांति धो लेते हैं।


(ii) हीमोग्लोबिन ट्यूब की 2 gm चिन्ह तक N/10 HCl से भर लेते हैं।

(iii) पाश्चर पिपेट की सहायता से 20 mm³ तक रक्त प्रतिस्थापित लेते हैं तथा इसी अंकित हीमोग्लोबिन ट्यूब जिसमें N/10 HCl भरा था, खाली कर देते हैं।

(iv) कांच की छड़ी से अच्छी तरह मिलाए तथा 5-10 मिनट तक हिलार रख देते हैं। इस बीच लगाभग 75% अम्लीय हीमेटिन का भूरा रंग विकसित हो जाता है।

(v) बूढ़-2 आसु जल डालकर तनुकरण करते हैं। भूरे रंग की तुलना मानक द्रव के रंग से तब तक करते हैं जब तक यह पूरी तरह इसमें मिल जाये।

इकाई - ग्राम प्रति 100 ml रक्त



(a)
हीमामीटर

दीर्घांगलीविन
दशुव

(d)
पाश्चर
पिपेट

Normal Value -

स्वस्थ पुरुष - $15.5 \pm 2.5 \text{ gm/100 ml blood}$

स्वस्थ स्त्री - $14.0 \pm 2.5 \text{ gm/100 ml blood}$

बिड़र (उमर 3 वर्ष) - $11.0 \pm 1.5 \text{ gm/100 ml blood}$

बच्चे (3-5 वर्ष) - $12.0 \pm 1.0 \text{ gm/100 ml blood}$

बिड़र (12-13 वर्ष) - $13.0 \pm 1.5 \text{ gm/100 ml blood}$

सामान्य सावधानियाँ - प्रयोग की समाप्ति पर WBC
पिपेट तथा हीमोसाइटोमीटर की भलीभांति धोकर व
सुखाकर रखते हैं।

उद्देश्य - Haematocrit value or Packed cell Volume, PCV ज्ञात करना।

सामग्री - विन्ड्रॉव हीमैटोक्रिट ट्यूब अथवा कैथिका नली, सिप्रत लैम्प, रैवटीकाइड सिप्रत, अमीनिथम ऑक्सलेट, स्कैल।


सिद्धान्त :- कुल रक्त में $\frac{WBC}{RBC}$ का प्रतिशत हीमैटोक्रिट कहलाता है। जब ऑक्सलेट युक्त रक्त प्रतिक्रिया की कॉच की ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। इसका मान पुरुष में लगभग 45% होता है।

साधारण कैथिका नली द्वारा हीमैटोक्रिट ज्ञात करना -

- (a) कैपिलरी एवज्ञान अथवा पृष्ठ तनाव के कारण रक्त कैथिका नली में अपने आप ऊपर चढ़ जायेगा।
- (b) अब कैथिका नली के एक सिरे को सिप्रत लैम्प की ज्वाला पर खड़ी सावधानी से खंड कर देते हैं।
- (c) खंड सिरे को नीचे रखते हुए नली को सीधा करते हैं और रक्त कॉलम की लम्बाई स्कैल की सहायता से नाप कर नोट कर लेते हैं।
- (d) अब इसे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखकर 30 minutes तक सेंट्रीफ्यूज करते हैं (गति 3000 r.p.m.)
- (e) RBC कैथिका नली में नीचे की ओर एकत्रित होकर पैक हो जाती है पैक हुई RBCs की लम्बाई नाप कर नोट कर लेते हैं। पुनः 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं और RBC कॉलम की लम्बाई में हुए इस परिवर्तन को नोट कर लेते हैं।

गणना -

$$\text{हीमैटोक्रिट} = \frac{\text{कैथिका नली में पैक RBCs की ल.} \times 100}{\text{कैथिका नली में कुल रक्त कॉलम की ल.}}$$



diag - (a) हीमेट्रीकट ट्यूब (विन्ड्रॉव ट्यूब)

(b) रक्त प्रतिदृश्य युक्त कैगिका मली

(c) पैक कॅगिकाएँ

Normal value

पुरुष 45% (परास 45-54%)

स्त्री 42% (परास 37-47%)

(कम RBC होने के कारण पुरुष की अपेक्षा स्त्री में हीमेटोक्रिट का मान कम होता है)

45% से कम - एनीमिया

45% से अधिक - पॉलीसाइडमिया
निर्जलीकरण

(ब) विन्ड्रॉव टेबुल से हीमेटोक्रिट ज्ञात करना :- विन्ड्रॉव टेबुल कांच की नली होती है जो पैके पर चपटी व बंद होती है।

विधि :- (i) ऑक्सीलेट रक्त का प्रतिदर्श पिपेट की सहायता से 0 बिन्दु तक विन्ड्रॉव टेबुल में डाला जाता है।

(ii) इस टेबुल की अब 30 मिनट तक सैन्डीफ्युज करते हैं।

(iii) पैके RBC सतह का ऊपरी सिरा नीट करते हैं।

(iv) तब पुरुष 15-20 मिनट के लिए सैन्डीफ्युज करते हैं।

(v) टेबुल में सबसे ऊपर प्लाज्मा की स्पष्ट पीली भूरी परत होती है। इसके बाद पतली उर्वर घुसल सतह के रूप में प्लेटलेट्स व ल्यूकोसाइट्स होती हैं।


(vi) चूंकि विन्ड्रॉव टेबुल में रक्त कॉलम की ल. 100 ml होती है, अतः पैके RBC का आयतन प्रतिशत में सीधा पढ़ लिया जाता है।

उद्देश्य - Demonstration of Enzyme Activity (Catalase) in Liver

सामग्री - भक्त सार, कीकर, ड्रॉपर, पिपेट, स्प्रिट लैम्प, मार्किंग, पेन्सिल etc.

रासायन अभिकर्मक - हाइड्रोजन परोक्साइड, आसुत जल।

सिद्धान्त - प्रत्येक प्राणी शरीर की जीव रासायनिक अभिक्रियाएँ एन्जाइम के द्वारा ही सम्पन्न व नियंत्रित होती हैं। एन्जाइम एक उत्प्रेरक की भाँति कार्य करता है जो अभि. की दर को बढ़ा देता है। भक्त वह अंग है जो विषैले पदार्थ को विघटित करता है। विषैले पदार्थों का विघटन भक्त में पाये जाने वाले विभिन्न एन्जाइम जटिल द्वारा सम्पन्न होता है।



विधि :-

- (i) भक्त सार तैयार करना :- जीवित घुटे अथवा मूँठक का विच्छेदन कर भक्त निकालकर भक्त को खरल में 50 ml आसुत जल के साथ पीसते हैं।
- (ii) दो परखनलियाँ लेते हैं तथा एक पर 10, तथा दूसरी पर 10, अंकित करते हैं।
- (iii) 'A' अंकित परखनली में कुछ भक्त सार लेते हैं तथा कुछ बूँदें हाइड्रोजन परोक्साइड की डालते हैं।
- (iv) हाइड्रोजन परोक्साइड के विघटन से उत्पन्न O_2 के कारण तेजी से बुलबुले उठते हैं।

परिणाम :- अधिक सार की उबालने पर एन्जाइम कैटेलेज नष्ट हो जाता है अतः हाइड्रोजन परॉक्साइड विघटित नहीं हो पाता। यही कारण है कि 'C' परखनली में बुलबुले नहीं निकलते जबकि 'A' अंकित परखनली में अधिक सार में उपर कैटेलेज के कारण हाइड्रोजन परॉक्साइड विघटित हो जाता है।

सावधानियाँ -

- (i) ताजा हाइड्रोजन परॉक्साइड ही प्रयोग हेतु काम में लेते हैं क्योंकि बहुत दिनों से अथवा समयान्तराल में रखा हुआ हाइड्रोजन परॉक्साइड ऑक्सीकृत हो जाता है।
- (ii) परखनली, बीकर व ड्रॉपर अत्यन्त स्वच्छ होने चाहिए।

उद्देश्य - एमाइलोज द्वारा पाचन का अध्ययन करना अथवा लारिय पाचन (salivary digestion) का अध्ययन करना।

सामग्री - पैराफिन व जीवित कोंकरीच

अभिकर्मक - (1) फॉस्फैट बफर :- 27.2 gm पोटैशियम डाइ हाइड्रोजन फॉस्फैट की 200 ml आसुत जल में घोल

(2) आयोडीन - (1%) - 6.0 gm पोटैशियम आयोडाइड + 2.0 gm I क्रिस्टल की 100 ml आसुत जल

(3) स्टार्च (1%) - 1 gm स्टार्च पाउडर की 100 ml

(4) NaCl (0.3%) - 0.3 gm NaCl की 100 ml आसुत जल

सिद्धान्त :- मुख में भोजन का पाचन लार में पाये जाने वाले एमाइलोज या टायलिन द्वारा शुरू हो जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज व माल्टोज में बदल देता है। एमाइलोज 6.6 pH पर कार्य करता है तथा प्लीराइड आयन एक्टिवेटर के रूप में कार्य करते हैं। जब एमाइलोज एन्जाइम सबस्ट्रेट स्टार्च पर कार्य करते हैं

विधि :-

(i) कोंकरीच की लार ग्रंथियों को काम में लाया जा सकता है इसके लिए 5-7 जीवित कोंकरीच का पिचर्डन कर लार ग्रंथियाँ निकालते हैं।

(ii) 5 ml लार लेकर 50 ml आसुत जल के साथ तनु कर व प्रयोग में लेते हैं।

(iii) दो परखनली लेते हैं तथा उनमें से एक पर टेस्ट (T) व दूसरी पर कन्ट्रोल (C) अंकित करते हैं।

(iv) 1 ml तनु लार दोनों परखनलियों में डालते हैं।

(v) C अंकित परखनली के विलयन की 2 मिनट उबालते हैं।

(vi) दो अन्य परखनलियों में 5 ml स्टार्च विलयन, 1 ml सोडियम क्लोराइड विलयन तथा 2 ml फॉस्फेट बफर डालते हैं।

(vii) उक्त परखनलियों के विलयन की T व C अंकित परखनलियों में डालते हैं तथा 37°C तापक्रम पर जल उबमक पर 60 मिनट तक उबमायन करते हैं।

(viii) परखनली C व T प्रत्येक में 1-2 बूँद आयोडीन की मिलाते हैं तथा रंग परिवर्तन की नोट करते हैं। परखनली C में नीला रंग तथा परखनली T में हल्का पीला रंग अवका कीर्ति रंग नहीं दिखाई देता है। एमाइलैज द्वारा स्टार्च के जल अपघटन का सुचक है जिसके फलस्वरूप गार्किरा (ग्लूकीज + माल्टीज) का निर्माण होता है।

परिणाम :- अतः स्पष्ट है कि लार में पायी जाने वाला एन्जाइम एमाइलैज स्टार्च को जल अपघटित कर माल्टीज व ग्लूकीज में बदल देता है।

उद्देश्य -

Detection of proteins in the animal tissue / food samples.


Protein :- प्रोटीन उच्च अणु भार वाले N युक्त कार्बनिक यौगिक हैं जो अमीनो अम्लों से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन तीन प्रकार की होती है -

1. सरल प्रोटीन
2. संयुक्त प्रोटीन
3. व्युत्पन्न प्रोटीन

Detection of proteins -

(1) Biuret Test :- सामग्री - परखनली, स्प्रिट, टॉमस अभिकर्मक -
 (i) 10% NaOH (10 gm NaOH को 100 ml)
 (ii) 0.5% व्युत्पिक्त सल्फेट (0.5 gm $CuSO_4$ को 100 ml)

सिद्धान्त - जब प्रोटीन के को अणुओं को $180^\circ C$ ताप पर गर्म किया जाता है तो अमीनो अम्ल का एक अणु बाहर निकल जाता है तथा बाइयुरेट बनता है। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो सकती है -



विधि :- स्पर्श परखनली में 2-3 ml टेस्ट सैम्पल लेकर बराबर मात्रा में NaOH मिलाते हैं। तत्पश्चात् बुँद-2 कर तनु वसुप्रिक सल्फैट विलयन मिलाकर हिलाते हैं। बैंगनी-नीला अथवा गुलाबी नीला रंग प्रोटीन की उप. का सूचक है।


नोट :-

(1) अधिक मात्रा में वसुप्रिक सल्फैट विलयन नहीं मिलाते अन्यथा यह कॉपर हाइड्रॉक्साइड के रूप में अवक्षेपित होकर रंग जटिल में बाधा डालता है।

(2) निनहाइड्रिन टेस्ट

सामग्री - 0.2% निनहाइड्रिन का जलीय विलयन, अन्य सामग्री वाइयुरेट टेस्ट के अनुसार।

सिद्धान्त :- जब अमीनी अम्ल अथवा प्रोटीन को निनहाइड्रिन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीकृत हो जाता है और अमीनिया वाहर निकल जाती है। इसमें अंतिम उत्पाद रूटमैन बैंगनी जै रासायनिक रूप से डाइकीटीहाइड्रिन डाइलिन्डीन-डाइकीटीहाइड्रिनडामिन होता है, बनता है -



विधि :- गुठक व स्पर्श परखनली में 5 ml प्रोटीन का विलयन लेते हैं और उसमें 0.5 ml निनहाइड्रिन विलयन मिलाते हैं। यह परीक्षण प्रोटीन, पेप्टीन, पेप्टाइड व अमीनी अम्ल सभी के लिए धनात्मक होता है।



Teacher's Signature.....

विधि - यह परखनली में बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स का विलयन लेकर मॉलिब्डा अभिकर्मक की 2-3 बुँद डालते हैं। अब 2-3 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल परखनली में कीवार है, सहारे धीरे-2 डालते हैं।

मौनी सैकराइड्स (ग्लूकोज व फ्रक्टोज) के परीक्षण -
(v) अपचयन परीक्षण - कार्बोहाइड्रेट्स में एक स्वतंत्र व संभावित स्वतंत्र कार्बोनिल समूह।

1. बैनेडिक्ट परीक्षण -
सामग्री - बैनेडिक्ट विलयन।

सिद्धान्त :- कॉपर सल्फेट के Cu^{++} आयन ऑक्सीकारक आयन के रूप में कार्य करते हैं जो क्षार (सोडियम कार्बोनेट) की उपस्थिति में शर्करा को जटिल शर्करा अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। हासायनिक अभिक्रिया की निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है -



विधि -

(i) एक परखनली में 4-5 ml बैनेडिक्ट विलयन लेकर गर्म करते हैं। रंग में कोई परिवर्तन नहीं होना इस बात का सूचक है कि इसमें कोई अपचयन पदार्थ अणु के रूप में विद्यमान नहीं है।

(ii) अब 7-8 बुँदे शर्करा विलयन भी डालते हैं तथा 2 मिनट तक उबालते हैं।

घोल पर स्थित कलर चार्ट से मिलान करते हैं शर्करा की प्रतिशतता निम्न प्रकार है - पीला - 1.0, नारंगी - 1.5, हरा - 0.5, लाल - 2.0।

उद्देश्य - Detection of lipids in the animal tissue/ food samples.

Tests for lipids -

वसा जल में अव्युलनशील परन्तु कार्बनिक ध्रुवीय विलायक यथा एल्कीहॉल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन व ईथर में विलेय होते हैं रासायनिक रूप से ये वसा अम्लों के एस्टर अथवा एस्टर बनाने में सहज पदार्थ हैं।

1. विलेयता परीक्षा -

सामग्री - एसीटोन व ईथर।

सिद्धान्त - वसा कार्बनिक ध्रुवीय व अध्रुवीय विलायकों में व्युलकर स्पष्ट विलयन बनाते हैं जबकि जल में अव्युलनशील होते हैं।

विधि :-

- (i) तीन परखनली लेकर उनमें एक पर 1, दूसरी पर 2 व तीसरी पर 3 चिन्हित करते हैं।
- (ii) प्रथम 1 - 3 ml एसीटोन, द्वितीय 2 में ईथर व तृतीय 3 में जल लेते हैं।
- (iii) अब प्रत्येक में 2 बूँद तैल की डालते हैं तथा परखनली का मुँह अंगुली से बंद कर जीर्ण से हिलाते हैं।
- (iv) कुछ देर पश्चात् हम देखते हैं कि प्रथम व द्वितीय परखनलियों में स्पष्ट विलयन नजर आता है जबकि तीसरी परखनली में तैल की छीली-2 बूँदें भी सतह पर जमा हो जाती हैं।

साबुनीकरण परीक्षण

2. सामग्री - 2% NaOH का जलीय विलयन, सांद्र HCl सोडियम वलौराइट का संतृप्त विलयन तथा 1% CaCl_2 का जलीय विलयन।

सिद्धान्त :- वसाओं का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। सांद्र HCl की उपस्थिति में यह साबुन वसा अम्ल में बदल जाता है जो सतह पर नन्दी-2 बुँदी के रूप में संघनित होकर तैरता है।

विधि :- (i) एक बॉयलिंग ट्यूब में लगभग 10 ml 2% NaOH का विलयन लेते हैं जिसमें 5-6 बुँदे तेल मिलाकर हिलाते हैं।

(ii) इसे 15 मिनट तक जल उबमक में गर्म करते हैं।

(iii) कमरे के ताप पर इसे ठंडा होने देते हैं। स्पष्ट साबुन सृश्य विलयन बनता है। इसे तीन भागों में बाँटे - प्रथम कुछ सांद्र HCl की बुँदे, द्वितीय में NaCl का संतृप्त विलयन तथा तृतीय में CaCl_2 का 1% जलीय विलयन डालते हैं।

उद्देश्य - Demonstration of separation of amino acids from a mixture using paper Chromatography / TLC
 सामग्री - वैपर कौमैटीग्राफी का चैम्बर, वाटमैन नं. 1, फिल्टर वैपर, ७५ टैनॉल, निनहाइड्रीन।

विलयन तैयार करना :- १ - ७५ टैनॉल, ग्लिसिल एसिटिक अम्ल व आसुत जल (4:1:5 अनुपात) लेकर चैम्बर में डालते हैं।

विधि :- सुविधानुसार लम्बाई का वाटमैन फिल्टर वैपर लेते हैं। इसके एक सिरे से लगभग 10 cm दूरी पर महीन पेन्सिल से एक सीधी रेखा खींचते हैं और समान दूरी पर बिंदु A, B, C तथा D अंकित करते हैं। कुछ अमीनो अम्ल लेकर 50% आबसीप्रोपाबल एल्कोहॉल में विलयन बनाते हैं।


अन्य परखनलियाँ में उक्त अमीनो अम्लों का प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष मानक विलयन (2.5 $\mu\text{g}/\text{ml}$) तैयार करते हैं।

भव क्रमशः A, B, C व D पर उक्त मानक विलयनों की 10 μl मात्रा डालते हैं तथा बिंदु D पर इतनी ही मात्रा निश्चित अम्लों के विलयन की डालते हैं। इसके बाद फिल्टर वैपर को चैम्बर में झुलीझांति लटकाकर अंकित रेखा से कुछ नीचे विलयन में डूबी दिया जाता है।

कौशिका क्रिया द्वारा विलयन अमीनो अम्लों का साव लेता हुए फिल्टर वैपर पर गमन करता है। वैपर को सुखा लिया जाता है और उस पर निनहाइड्रीन (0.2% निनहाइड्रीन, एसिटोन में) का स्प्रे करते हैं।

100°C ताप पर ओवन में लगभग 10 मिनट तक रखते हैं।

अमीनी अम्लों के चमकीले दागों दिखाई देते हैं जिन्हें पेंसिल से गीला बनाकर चिन्हित कर देते हैं।




Paper Chromatogram

प्रोलीन, हाइड्रॉक्सीप्रोलीन निनहाइड्रिन के साथ पीला रंग देते हैं अन्यथा अन्य अमीनी अम्ल गुलाबी।

$$R_f = \frac{\text{विलेय द्वारा तय की गई दूरी}}{\text{विलायक द्वारा तय की गई दूरी}}$$

किसी दिए गए अमीनी अम्ल के लिए एक ऐसी प्रायोगिक परिस्थितियाँ जैसे विलायक तंत्र, फिल्टर पेपर, ताप तथा विलेय की सांद्रता में R_f का मान निश्चित होता है।

Teacher's Signature.....




खरगोश के आमांशय का अनुपस्थित भाग

खरगोश के आमाशय (Stomach) का अनुप्रस्थ काट

Comments -


- (i) आमाशय के काट में पैरीटोनियल उपकला व तंतुमय संयोजी उत्तक का वाह्य पतल स्तर सिरोंसा उपस्थित होता है।
- (ii) पैरीय स्तर अपेक्षाकृत सिरोंसा के नीचे स्थित होता है।
- (iii) अधः वृल्लिमिका स्तर अपेक्षाकृत मीठी संयोजी उत्तक से बना रुधिर वाहिनियों व तंत्रिका तंतुमय स्तर होता है।
- (iv) वृहिकुंचन आमाशय की आंतरिक वृल्लिमिका पर बनाने वाला स्तर है।
- (v) इसमें पाचन ग्रंथियों स्तम्भी कीशिकाएँ गहरे संकरे वलय बनाते हुए उपस्थित होती हैं।



खरगोश की आंत्र का अनुप्रस्थ काट

Comment -

1. काट में बॉहम लसीकला या सिरिसा स्तर चपटी पैरीटोनियल कीशिकायों के चतुर्थ स्तरों से बना होता है
2. पैरी स्तर में बाह्य पतली अनुदैर्घ्य पैशिया व भिन्नी वृताकार पैशियाएँ से बनी होती हैं।
3. मध्य: वलैमिक स्तर में संयोजी उत्तक, रक्त एवं लसिका वाहिनियाँ तथा तंत्रिका तन्तु पाए जाते हैं।
4. पैशिया वलैमिक स्तर में बाह्य चिकनी पैशिया अनुदैर्घ्य व भिन्नी वृताकार पैशियाएँ पायी जाती हैं।
5. आंत्र के वलैमिक स्तर में स्सांकुरी के मध्य ऊपर से नीचे तक सरल या शाखाकार वलैमियाएँ होती हैं।



Hepatic
Vein



Hepatic
cell

Hepatic
Labule

dig. खरगौडा के भक्त का अनुप्रसव काट

Comment -

1. खरगोश का यकृत पाँच पालियों में विभक्त होता है यकृत के अनुप्रख काट में बहुभुजी इकाइयाँ या लीवर्युला अनेक पालियाँ बनाती हैं।
2. इन पालियों की ग्लिसनस का सम्प्रुत कहते हैं। पालियों के बीच संयोजी उत्तक के पट्टे पाए जाते हैं।
3. पालियों में बहुफलकीय यकृत का अरीय रूप में व्यवस्थित होती है।
4. यकृत के कार्य पित्त का स्रावण करना है।
5. यह संग्रहित करना डाकिरा का व पदार्थों का स्थानान्तरण कर भुरिया में बदलना आदि कार्य करता है।




dig - खरगौश के वृक्क का अनुप्रस्थ काट

खरगोश के वृक्क (Kidney) का अनुप्रस्थ काट

Comment-

- (i) वृक्क की काट में अनेकी वृक्क नलिकाएँ केशिका गुच्छ वैनस सम्पुट आदि दिखाई देती हैं।
- (ii) मैलपीघी काय काट में गोलकाए छली के रूप में दिखाई देता है।
- (iii) वृक्क नलिकाओं वृक्क के रूप में दिखाई देता है।
- (iv) निकटस्थ कुण्डिलत नलिका की केशिकाएँ पक्षमाश्रित प्रकार की होती हैं।
- (v) रक्त वाहिकाएँ रक्त कणिकाएँ एवं संयोजी उत्तक वृक्क नलिकाओं के मध्य पाया जाता है।




dig. - खरगीरा है अनायास ही अनुपस्थित

खरगोश की अगनाबाय (Panchayats) का अनुप्रस्थ काट

Comment -

- (i) यह विस्तृत प्रकार की पालित ग्रंथियाँ हैं
- (ii) यह वांछित नलिकाओं से रहित होती हैं
- (iii) प्रत्येक फुल्ल कौष्ठ काट में स्तम्भी या दन्ताकार
cell से बनी पल्ल के रूप में दिखाई देती हैं
- (iv) कौष्ठ गुच्छों के बीच-बीच में अनेक प्रकार
के लैंगरहेंस की द्विप समुह स्थित होती हैं
- (v) लैंगरहेंस के द्विप समुह अन्तः स्त्रावी एवं अगनाबाय
cell जी पान्चक रसों का स्त्रावण करती हैं




द्वि-खरगौदा की पीढ़े रज्जु का अनुसरण काट

खरगोश की रीढ़ रज्जु (spinal cord) का अनुप्रस्थ काट

Comment -

- (i) रीढ़ रज्जु तीन मिल्लियी इंचुरामैटर, एरैक्नॉइड व पायामीटर द्वारा घिरी रहती है।
- (ii) रीढ़ रज्जु काट में लगभग अंडाकार होती है।
- (iii) काट के केन्द्र में केन्द्रीय नाल एक स्त्री स्तरीय स्तम्भी canal द्वारा आसुरित होती है।
- (iv) प्रत्येक खण्ड में कशौककाओं की संख्या के अनुसार वनसे रीढ़ तंत्रिकाएं निकलती है।
- (v) धुसर द्रव्य से प्रबल मूल पर पृष्ठीय पार्श्व शृंग व अधर मूल पर पार्श्व अधरीय शृंग निकलते हैं।




खरबीरा के वृषण का अनुप्रस्थ काट

खरगोश के वृषण (testis) का अनुप्रख काट

Comment -

- (i) वृषण पर बाह्य आवरण तंतुमय झंझीजी उत्तक से बना श्वेत कंचुक उपस्थित होती है।
- (ii) वृषण में अनेक पालिकाएँ होती हैं।
- (iii) जलन की शिकाएँ शुक्राणु जनन cell उत्पन्न करती हैं।
- (iv) शुक्राणु जनन cell के बीच-2 में बड़ी cell पाई जाती है, जिन्हें सर्टोली cell कहते हैं।
- (v) यह अन्तः स्त्रावी ग्रंथियों का कार्य करती है।




dig- खरगोश की अंडाशय का अनुप्रस्थ काट

खरगोश के अंडाशय (Ovary) का अनुसर्ष काट

Comment -

- (i) इसमें तीन परतें होती हैं।
- (ii) अंडाशय में उपस्थित अवकाश पिटिका कहलाता है।
- (iii) अंडाशय पर बाह्य पैरीटीनियल स्तर का आवरण उपस्थित होता है।
- (iv) बत्ताफी पुद्दक में अंड एवं पुद्दक cell से एक संयोजी तल से अवकाश होता है।
- (v) कार्पलिस ल्युटियम के दामित होने पर एक श्वेत द्रव उत्पन्न रह जाता है।



Blood Capillaries

Blood vessel


Alveoli

diag - खरगीश के फेफड़े का अनुप्रख काट

खरगोश के फेफड़े (lung) का अनुप्रस्थ काट

Comment -


- (i) काट में अनेक वायु से भरी गुहाएँ खीखली कुपिकाएँ चमकती हुयी दिखाई देती हैं।
- (ii) प्रत्येक कुपिका संयोजी उत्तक की बनी भित्ति से परिसीमित होती है।
- (iii) कुपिकाएँ ब्रॉंकिओल्स के फुले हुए अन्तस्व भाग होती हैं।
- (iv) इसमें केन्द्रीय गुहा अनुपस्थित होती है।
- (v) फेफड़े की बाह्य अमूढाकन पर्त, पैरीटीनियम की बनी होती है।



dig - T.S of Spleen

Comment -


- (i) प्लीहा सबसे बड़ी लसीका ग्रंथि है, जो विभिन्न और हेवीफार आपरन, सफेद गूदे से बनी होती है।
- (ii) यह ल्यूकोसाइट्स का भंडारण और संश्लेषण करना शामिल है।
- (iii) मूत्रा अपरखा में, प्लीहा एरिथ्रोसाइट्स का उत्पादन करती है।
- (iv) लाल गूदा प्लीहा में उसका रंग देता है।
- (v) सफेद गूदे में लिम्फोसाइटों की सघन मात्रा होती है।



diag - Adrenal gland

Comment -

- (i) स्तनधारियों में दो अधिवृक्क ग्रंथियाँ होती हैं प्रत्येक गुर्दे के ऊपर एक।
- (ii) प्रत्येक अधिवृक्क ग्रंथि दो भागों से बनी होती है।
- (iii) बाहरी परत एड्रिनल कॉर्टेक्स है।
- (iv) अधिवृक्क मज्जा में कोर्माफिन लय होती है।




diag - T.S of thyroid gland

Hybrid

का अनुप्रस्थ काट

Comment -

- (i) स्तनधारिणी में बाइरॉइड ग्रंथि गर्दन में तितली के आकार की एक महत्वपूर्ण अंतः स्रावी ग्रंथि है। यह हार्मोन शरीर में उच्च के उपयोग को नियंत्रित करती है।
- (ii) यह हार्मोन विकास और परिपक्वता के लिए महत्वपूर्ण होती है।
- (iii) बाइरॉइड ग्रंथि में सी- कीबिकाई डीएलसीटीमिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है।
- (iv) यह मुख्य रूप से हार्मोन स्रावित करती है।




dig - T.S Parathyroid gland

Parathyroid का अनुसंधान

Comment -

- (i) पैराथायरॉइड ग्रंथियाँ बाइरॉइड के पास मटर के आकार की चार अंतः स्त्रावी ग्रंथियाँ होती हैं।
- (ii) पैराथायरॉइड ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य PTH का उत्पादन और स्राव करना है।
- (iii) PTH के कम उत्पादन से रक्त में Ca^{2+} की कमी हो जाती है।
- (iv) अतः में Ca^{2+} के अवशोषण के लिए विटामिन D की सक्रिय करके रक्त में Ca और P के स्तर को नियमित करता है।



dig - pituitary

Comment -

- (i) यह मास्टर से निचले भाग में स्थित एक छोटी, गोल और आकार की ग्रंथि है।
- (ii) इससे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं।
- (iii) यह नौ से अधिक स्रावित करती है जो विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं।
- (iv) यह हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है।