




R. K. GROUP OF COLLEGE

BEHIND KALWAR POLICE STATION, KALWAR, JAIPUR (RAJ.)



CERTIFICATE

Name: Anita choudhary

Class: B.Sc V Sem.

Roll No.:

Exam No.:

Institution _____

This is certified to be the bonafide work of the student in the _____

_____ Laboratory during the academic

year 20_____/20

No of practicals certified _____ out of _____ in the

subject of Chemistry

.....
Teacher in-charge

.....
Examiner's Signature

.....
Principal

Date :

institution Rubber stamp

university of rajasthan

B.Sc.semester 5th (CHEMISTRY) Practical- (A)

min marks 18

duration _5hrs.

Max Mark's 40

Ex1 To preparation of Potassium trioxalatochromate(III)trihydrate,
 $K_3[Cr(C_2O_4)_3]$ (10)

Or

To preparation of . Hexammine nickel (II) chloride, $[Ni(NH_3)_6]Cl$

Ex2 Separation and identification of given organic mixture containing two. solid compound using water/ $NaHCO_3$ and prepare suitable derivative.(10)

(A) Nephthalene (B) salicylic acid

Ex3 To determine the solubility and solubility product of sparingly soluble electrolyte conductometrically. (10)

Ex4.viva-voice. (5)

Ex5 Record. (5)

university of rajasthan

B.Sc. semester 5th (CHEMISTRY) Practical- (B)

min marks 18

duration _5hrs.

Max Mark's 40

Ex1 . To preparation of . Hexammine nickel (II) chloride, $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_2$
(10)

Or

. Tris (Thiourea) copper (I) sulphate, $[\text{Cu}_3[\text{CS}(\text{NH}_3)_2]_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Ex2 Separation and identification of given organic mixture containing two. solid compound using water/ NaHCO_3 and prepare suitable derivative.(10)

(A) m-dinitro benzene (B) glucose

Ex3 To determine the strength of given acid(HCl) conductometrically is using standard alkali solution. (10)

Ex4.viva-voice. (5)

Ex5 Record. (5)

university of rajasthan

B.Sc.semester 5th (CHEMISTRY) Practical- (C)

min marks 18

duration _5hrs.

Max Mark's 40

Ex1 p russian blue [Iron (III) hexacyano ferrate (II)], $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$. (10)

Or

.Tris (Thiourea) copper (I) sulphate, $[\text{Cu}_3(\text{CS}(\text{NH}_3)_2)_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}]$

Ex2 .Separation and identification of given organic mixture containing two. solid compound using water/ NaHCO_3 and prepare suitable derivative.(10)

(A) Oxalic acid (B) alpha Nepthol

Ex3 To determine the strength of given weak acid(CH_3COOH)
conductometric using standard alkali solution (12)

Or

Ex4.viva-voice. (5)


Ex5 Record. (5)

INDEX

S. No.	Name of Experiment	Page No.	Date of Experiment	Date of Submission	Remarks
1.	पोटैशियम ट्राईऑक्साइड कीमीट (III) k_3 $[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ बनाना।				
2.	एवसाएमीन निकल (II) क्लीराइट तैयार करना				
3.	ट्रिस (ब्यामीथुरिया) कॉपर (I) सल्फेट का बनाना।				
4.	फेरिक क्लोराइड $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$ तैयार करना।				
5.	दिए गए कार्बनिक यौगिक की प्रवृत्त करने हुए यौगिक A व B पहचान करना। व व्युत्पन्न करना।				
6.	दिए गए कार्बनिक यौगिक की प्रवृत्त करने हुए यौगिक A व B पहचान करना व किसी एक व्युत्पन्न ज्ञात करना।				
7.	दिए गए कार्बनिक यौगिक की प्रवृत्त करने हुए यौगिक A व B पहचान करना व किसी एक व्युत्पन्न की ज्ञात करना।				

S. No.	Name of Experiment	Page No.	Date of Experiment	Date of Submission	Remarks
8.	दिए गए मिश्रण में सै कार्बनिक यौगिकों की संख्या ज्ञात करना।				
9.	दिए गए मिश्रण में सै कार्बनिक यौगिकों की संख्या ज्ञात करना।				
10.	चालकता मापी द्वारा $N_{90}M$ (प्रबल क्षार) से अनुमापन करके M_{40} (प्रबल अम्ल) की सांद्रता ज्ञात करना।				
11.	दिए गए अल्प विलेय लवण की विलेयता का निर्धारण चालकता मापी विधि से ज्ञात करना।				
12.	चालकता मापी विधि से दिए गए दुर्बल अम्ल (CH_3COOH) की $N_{90}M$ (प्रबल क्षार) से अनुमापन कर सांद्रता ज्ञात करना।				
13.	चालकता मापी विधि द्वारा दिए गए (HCl) प्रबल अम्ल विलयन की $(N_{40}M)$ दुर्बल क्षार विलयन से अनुमापन कर सांद्रता ज्ञात करना।				

उद्देश्य - पीट्रिगियम डाइऑक्साइड की मैट (III)

आवश्यक उपकरण - ऑक्सैलिक एसिड ($H_2SO_4 \cdot 2H_2O$)(ii) पीट्रिगियम ऑक्सैलैट ($K_2C_2O_4 \cdot H_2O$)(iii) ठीस पीट्रिगियम डाइक्रोमेट ($K_2Cr_2O_7$)


(iv) डबाडल (v) एल्कीहॉल

विधि :-


250ml बीकर में 4.5 gm ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट की तैलकर उसे 20ml गर्म आसुत जल में घोलते हैं।

इसके बाद 1.5 gm पीट्रिगियम डाइक्रोमेट की ऑक्सैलिक एसिड के घोल में थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद इस घोल एक बीकर में डाल देते हैं। इसे उष्मक पर गर्म करते हैं। इसके बाद घोल की कमरे के तापमान पर ठंडा करते हैं। इसमें 10ml एबिल एल्कीहॉल मिलाते हैं। और 30-40 मिनट तक ठंडा होने देते हैं, जिससे गहरे हरे रंग के क्रिस्टल बन जाते हैं। फुकर फुनल का उपयोग करके क्रिस्टली की छान लेते हैं तथा 30% एबिल एल्कीहॉल और एसील्यूट एल्कीहॉल से धो लेते हैं। इसके बाद क्रिस्टल की सुखाते हैं।


Reaction -



Structure




Potassium trioxalato Cr(III)



गणना -

(i) Theoretical yield of the complex -



$$294 \text{ gm} = 487.3 \text{ gm}$$

$$1.5 \text{ gm} = 2.486 \text{ gm}$$

(ii) % practical yield -

2.486 gm of the product = 100% yield

$$\text{Wgm. of the product} = \frac{100 \times w}{2.486}$$

$$= \frac{100 \times 2.3}{2.486}$$


$$= 92.51\%$$

Result :-

(i) Theoretical yield = 2.486 gm.

(ii) प्रतिशत उत्पाद की मात्रा = 92.51%.

उद्देश्य :- हेक्सा एमीन निकल (II) क्लोराइड तैयार करना।




उपकरण - बीकर, कांच की छड़, ग्लास।

अभिकर्मक - निकल क्लोराइड = 4 gm

सांद्र अमोनिया विलयन = 10 ml.

अभिक्रिया :- निकल क्लोराइड विलयन में सांद्र अमोनिया विलयन मिलाने पर हेक्सा एमीन निकल क्लोराइड बनता है।





विधि :- 4 gm निकल क्लोराइड को चूर्ण कर एक बीकर में जल की न्यूनतम मात्रा में विलय करके बर्फ में रखकर ठंडा करती है। इस ठंडे विलयन में सांद्र अमोनिया विलयन लगातार हिलाते हुए मिलाने है। हेक्सा एमीन निकल क्लोराइड बिल्व ही अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेप को फिल्टर पत्र की सहायता से छानते है। तत्पश्चात इसे एसीटोन से धोकर कमरे के ताप पर हवा में सुखने के लिए रख देते है। कुछ अवक्षेप की तैल लेते है।

परिणाम - इसमें गहरे रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते है।


लाभ - 4 gm.

Reaction



उद्देश्य - द्रिस (वाथीयुरिया) कॉपर (I) सल्फेट का बनना।

अभिक्रिया -



सामग्री उपकरण - बीकर, ग्लास।

रासायनिक अभिकर्मक - वाथीयुरिया (10ml)

कॉपर सल्फेट - 10ml (2gm in 10ml)

पुनः क्रिस्टलीकरण मिश्रण

विधि :-

सर्वप्रथम दो अलग-2 बीकरों में 10ml कॉपर सल्फेट घोल और 10 मिलीलीटर वाथीयुरिया का घोल लेंगे हैं। इसमें कॉपर सल्फेट और वाथीयुरिया के मध्य अभिक्रिया होती है। इसमें विलयन का रंग पहले नीला होता है जो कि हाइड्रेट कॉपर के कारण होता है। इस अभि. के कारण घोल का रंग नीले से बदलकर सफेद या क्रीम रंग का बिपचिपा होय बन जाता है। अंत में ठंडा करने के बाद क्रिस्टल को निवार कर अलग कर लिया जाता है।

→ उत्पाद को 20ml पानी, 1ml वाथीसल्फेट/वाथीयुरिया और सल्फ्यूरिक एसिड (H_2SO_4) घोल की

1-2 बुंदों के मिश्रण का उपयोग करते पुनः

क्रिस्टलीकृत किया जाना चाहिए।

→ घोल को अधिकतम 30°C के ताप पर रखा जाता है।

- द्रव की ठंडा होने के बाद, क्रिस्टलीकृत उत्पाद की एकत्र करने के लिए द्रव की छानना चाहिए।
- एकत्रित उत्पाद को फिल्टर पेपर पर सुखाया जाता है।

Observation -

Colour - white

physical appearance - solid

परिणाम -

Yield - 2.78 gm

Colour - white

जमायिती - अष्टफलकीय

संकरण - Sp^3d^2

विशेषताएँ -

(i) उपभोग किए जाने वाले सभी उपकरण साफ होने चाहिए।




(ii) बहुत अधिक सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से बचें।

उद्देश्य - सुगिम्न हलु $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$ तैयार करना।

आवश्यक उपकरण - बीकर, कांच की छड़, वॉच ग्लास, कीप, फिल्टर पेपर और वनीर।

रसायन :- लौह भरावन (0.5 gm), सांद्रित HCl (5ml), सांद्रित HNO_3 (2ml), जल (100ml), और पोटैशियम फेरीसाइड विलम्ब।

Theory :- फेरिक क्लोराइड (FeCl_3) हवा ऐजिया के साथ लौह के भराव का इलाज करते प्राप्त किया जाता है। इस फेरिक क्लोराइड की फिर पोटैशियम फेरीसाइनाइड $[\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]]$ के साथ उपचारित करके फेरिक फेरीसाइनाइड बनाया जाता है, जिसे प्रशिया हलु के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रतिक्रिया का रासायनिक समीकरण निम्न है -



विधि :-

इसमें 0.5 gm लौह चूर्ण की एक बीकर में रखा जाता है। इसमें 5ml सांद्र HCl और 2ml सांद्र HNO_3 का मिश्रण मिलाया जाता है। इस मिश्रण को कांच की छड़ से धीरे-धीरे हिलाया जाता है। इसके बाद बीकर को वॉच ग्लास से ढक दिया जाता है।

- बॉल की ठंडा होने के बाद क्रिस्टलीकृत उत्पाद की एकत्र करने के लिए बॉल को छानना चाहिए।
- एकत्रित उत्पाद को फिल्टर पेपर पर सुखाया जाता है।

Observation -

Colour - white

Physical appearance - solid

परिणाम -

Yield - 2.78 gm

Colour - white

ज्यामिती - अष्टफलकीय

संकरण - sp^3d^2

विशेषताएँ -

- (i) उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण साफ होने चाहिए।
- (ii) बहुत अधिक सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से बचे।

उद्देश्य :- दिए गए कार्बनिक मिश्रण में कार्बनिक यौगिकों की प्रतिक्रिया करते हुए यौगिक A व B पहचान करना व व्युत्पन्न करना।

प्रारंभिक परीक्षण - भौतिक अवस्था - ठोस
 रंग - रंगहीन
 गंध - अक्रिय गंध
 विलेयता - जल में अविलेय


परीक्षण सारणी - Test for compound - "A"

क्र.सं.	प्रयोग	परीक्षण	परिणाम
1.	ज्वाला परीक्षण - पदार्थ की बौड़ी सी मात्रा स्पेचुला में लेकर आग में जलाते हैं	धुँदार ज्वाला है साथ जलता है	एरीमेटिक यौगिक है
2.	लिटमस परीक्षण - + लाल लिटमस पत्र तटव परीक्षण	Compound No Change	यौगिक उदासीन
3.	N_2 का परीक्षण - लैसानी	हरा / नीला रंग	Nitrogen Absent
4.	विलयन + ताजा बना $FeSO_4$ + $FeCl_3$ + दिल. HCl	प्राप्त	
(i)	सल्फर परीक्षण - रुड एसिटेट - लैसानी विलयन + $(CH_3COO)_2Pb$ (लैड एसिटेट)	काला अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है	सल्फर Ab.
(ii)	सोडियम नाइट्राई प्रसाद - लैसानी विलयन + $Na[Fe(CN)_5]$ No ताजा बना विलयन	बैंगनी रंग प्राप्त नहीं	S - Absent



Teacher's Signature.....

(C) हैलोजन परीक्षा - जैसानी विलयन + dil. HNO ₃ + ठंडा करके AgNO ₃ मिलाने पर।	श्वेत व पीला अवक्षेप प्राप्त नहीं होता।	X - Absent
5. क्रियात्मक समुह परीक्षा - Compound + निर्जल AlCl ₃ + 95% CHCl ₃ + Δ	हरा पीला रंग प्राप्त होता है।	C ₁₀ H ₈ (नैफथलीन) हो सकता है।
6. गलनांक	79°C प्राप्त	C ₁₀ H ₈
7. भौतिक का विश्लेषण परीक्षा - (i) Comp. + KMnO ₄ (ठोस) + Con. H ₂ SO ₄ + Δ + रिडॉ सीनॉल + Δ + NaOH	हरी प्रतिक्रिया प्राप्त होती है।	C ₁₀ H ₈ निश्चित
(ii) भौतिक + CHCl ₃ + AlCl ₃ निर्जल	हरा रंग Present	C ₁₀ H ₈ निश्चित

(B) व्युत्पन्न -



नैफथलीन

(2,4,6-ट्राई
नाइट्रो फिनॉल)

(प्रिंट)

Test for Compound - "B"

1. प्रांरजिक परीक्षा - भौतिक अवस्था = ठोस

गंध = झंझीन गंधहीन

रंग = रंगहीन

विलेयता = जल में विलेय

परीक्षा सारणी -

प्रयोग

परीक्षा

निष्कर्ष

2. ज्वलन परीक्षा - पदार्थ की बौड़ी सी मात्रा की स्पंदुला में लेकर आग से जलाते हैं।

कार्बनिक यौगिक बुझा रहित ज्वाला के साथ जलता है।

कार्बनिक यौगिक एलिफैटिक है।

3. लिटमस परीक्षा -

लाल लिटमस
Compound के नीला लिटमस +

कोई परिवर्तन नहीं

यौगिक उदासीन

4. तत्व परीक्षा -

(a) N_2 परीक्षा - लैसानी Sol.
+ $FeSO_4$ (ताजा) + $FeCl_3$ +
dil. HClनीले रंग का
Sol. प्राप्त

Nitrogen Absent

(b) सल्फर परीक्षा - CH_3COOH
+ लैसानी विलयन + $(CH_3COO)_2Pb$ काला अवक्षेप
प्राप्त


S - Absent

(c) हिलीजन परीक्षा -

लैसानी Sol. + dil. HNO_3 + Δ
+ ठंडा करके $AgNO_3$ मिलाने परबुबिल व पीला
अवक्षेप प्राप्त


Teacher's Signature.....

5. क्रियात्मक समुह परीक्षण -

मुल पदार्थ + dil. HCl +
NaNO₂ विलयन मिलाने परनीला बुड़बुड़ाहट
होती है।

6. गलनांक


130°C



7. भौतिक का विशेष परीक्षण -

Compound + NaOH + Δ +
dil. CuSO₄


purple colour



निश्चित

8. यूरिया का व्युत्पन्न :-

जल अपघटन से प्राप्त व्युत्पन्न




परिणाम :- दिए गए कार्बनिक मिश्रण में कार्बनिक
भौतिक की प्रवृत्त करने पर समुह A - नेफथलीन
व B - यूरिया प्राप्त होता है।

गलनांक क्रमशः - 79°C व 130°C प्राप्त होता है।
नेफथलीन का व्युत्पन्न प्रकट है।

Teacher's Signature.....

Mixture



NaHCO_3
में अविलय
(A)

NaHCO_3
में विलय
(B)

उद्देश्य :- दिए गए कार्बनिक यौगिकों की मिश्रण से प्रत्येक करना तथा यौगिक A व B की पहचान करना एवं किसी एक की व्युत्पन्न बताना।

Test for Compound - 'A'

1. प्रारम्भिक परीक्षण -

भौतिक अवस्था - ठोस

रंग - रंगहीन

गंध - असुचिकर गंध

विलेयता - जल में विलेय

परीक्षण सारणी -

प्रयोग	परीक्षण	निष्कर्ष
2. ज्वलन परीक्षण - स्पिरिटुला पर लेकर जलाने पर	कौं यौगिक धुँएदार ज्वाला के साथ जलता	एरीमेटिक यौगिक
3. लिटमस परीक्षण - Comp. + Red / blue Litmus papers	No Reaction	यौगिक उदासीन
4. तत्त्व परीक्षण (a) N_2 परीक्षण - लैसाने + ताजा बना $FeSO_4 + FeCl_3$ + dil. HCl	No Reaction	Nitrogen Ab.
(b) सल्फर परीक्षण - लैंड एसिटेट परीक्षण - $CH_3COOH +$ लैसाने $(CH_3COO)_2Pb$	कौं क्रिया नहीं करता	S - Absent

(C) हैलीजन परीक्षण -

लेस ले Solⁿ + dil. $\text{HNO}_3 + \Delta + \text{AgNO}_3$ मिलान पर
ठंडा करके

No Rox.

X - Absent

5. प्रियात्मक समुह परीक्षण -

Comp. + निजलि $\text{AlCl}_3 + \text{CHCl}_3$

हरा-पीलारंग

नैपवीनीन ही सकता

6. भौतिक का विशेष परीक्षण

(i) Compound + KMnO_4 (solid) +
Con. $\text{H}_2\text{SO}_4 + \Delta +$ रिसॉसिनॉल
+ $\Delta + \text{NaOH}$ Solution

हरी प्रतिदीप्ति
प्राप्त


C_{10}H_8 ही सकता है

(ii) Comp. + $\text{CHCl}_3 + \text{FeCl}_3$

हरा रंग प्राप्त
हीता है

C_{10}H_8 निश्चित

उत्पन्न :-



Test for Compound - 'B'

1. प्राथमिक परीक्षण - भौतिक अवस्था = ठोस

गंध - गंधहीन

रंग - रंगहीन



विलेयता - NaHCO_3 में विलेय

परीक्षा सारणी - प्रयोग		
प्रयोग	परीक्षा	निष्कर्ष
2. ज्वलन परीक्षा - पदार्थ की हल्की चूल्हा पर रखकर जलाने पर	भौतिक धुँआँदार ज्वाला है, साव	भौतिक, एरोमैटिक प्रकृति का है।
3. Litmus Test - Comp. + Red / blue litmus paper	नीले लिटमस है, लाल कर देता है	कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है।
4. (a) Nitrogen test - लैसार्ने Soln + ताजा बना $FeSO_4 + FeCl_3 + \text{dil. HCl}$	No Reaction	Nitrogen Ab.
(b) सल्फर परीक्षा - लैसार्ने $CH_3COOH + Soln + (CH_3COO)_2Pb$	No Reaction	S - Absent
(c) हैलीजन परीक्षा - लैसार्ने Soln + dil. HNO_3 ठंडा करके $AgNO_3$ मिलाने पर	No Reaction	X - Absent
5. क्रियात्मक समूह परीक्षा		
Comp. + Ethyl Alcohol + Con. $H_2SO_4 + \Delta + ठंडा + H_2O$	फली जैसी गंध आती है	कार्बोक्सिलिक (सिलिलिक अम्ल हो सकता है)
6. गलनांक	159°C	
7. भौतिक का विग्रह परीक्षा -		
(i) Comp. + $H_2O + FeCl_3$	गहरा बैंगनी रंग	$HO-C_6H_4-COOH$ है।
(ii) भौतिक + $CH_3OH + \text{Con. } H_2SO_4 + \Delta + ठंडा करके जल मिलाने पर$	विन्टर ग्रीन तैल की गंध	$HO-C_6H_4-COOH$ निश्चित (चमकीला लाल रंग)

परिणाम :-

दिए गए मिश्रण से कार्बनिक मिश्रण

Compound A व B प्राप्त होते हैं।

Compound 'A' -  (नेफथैलीन)Compound 'B' -  (सैलिसिलिक अम्ल)

उद्देश्य :- दिए गए मिश्रण में सै कार्बनिक यौगिक प्रत्येक करने हुए A व B की पहचान करना तथा किसी एक व्युत्पन्न बनाना।

Compound 'A'

1. प्रारम्भिक परीक्षण - भौतिक अवस्था - ठोस
 रंग - रंगहीन
 गंध - गंधहीन
 विलेयता - NaOH में विलेय

परीक्षण सारणी -

प्रयोग	परीक्षण	निष्कर्ष
2. ज्वलन परीक्षण - Comp. की स्पिरिट में लेकर भाँगे में जलाते हैं।	धुँदला ज्वाला है साथ जलता है	एरोमैटिक यौगिक है
3. लिटमस परीक्षण - Comp. + Red/blue litmus paper	नीला लिटमस पत्र लाल हो	यौगिक अम्लीय है।
4. तत्व परीक्षण -		
(a) Nitrogen test - लैसानी Soln + ताजा बना $FeSO_4 + FeCl_3$ Soln + dil. HCl	नीला हरा रंग प्राप्त नहीं	N - Absent
(b) हिलीजन परीक्षण - लैसानी क्लोरम + dil. $AgNO_3$ + ० + ठंडा करके $AgNO_3$ मिलाने पर	श्वेत/पीला अवक्षेप नहीं आता है	X^- - Absent

5. क्रियात्मक समूह परीक्षण

(a) फिनाल का परीक्षण - पदार्थ वैंगनी रंग प्राप्त होता है - OH समूह उप.

का एल्कीली विलयन + $FeCl_3$ विलयन डालने पर लाल रंग, हल्का रंग प्राप्त B - नेफथीनॉल- Comp. + टारट्रिनिक Acid + Con. H_2SO_4 हरा रंग प्राप्त B - नेफथीनॉल ही सकता है- Comp + $NaNO_3 + \Delta$ dil. H_2SO_4 B - नेफथीनॉल ही

6. गलनांक

123°C

B - नेफथीनॉल ही


7. भौतिक का विशिष्ट परीक्षण -

Comp. + $H_2O + FeCl_3$ उर्वर दुधियाComp. + KOH Soln + $CHCl_3$ नीला रंगComp. + $I_2 + NaOH$ Soln वैंगनी रंग

B - नेफथीनॉल निश्चित है

B - नेफथीनॉल ही

8. व्युत्पन्न बनाना -



Test Compound - (B)

1. प्राथमिक परीक्षण - भौतिक अवस्था = ठोस

रंग = रंगहीन

गंध = एल्कीडॉलिक

विलेयता = NaOH में विलेय

परीक्षण साखी -

प्रयोग

परीक्षण

निष्कर्ष

2. ज्वलन परीक्षण - Comp. की

चुंदा ज्वाला के साथ जलता


एरीमेटिक यौगिक

स्पिरुला में गर्म करते हैं


Teacher's Signature.....

3.	लिटमस परीक्षण - Comp. + Red/blue Litmus paper	लाल लिटमस पत्र नीला हो	भौतिक क्षारीय है
4.	तत्त्व परीक्षण - (a) N - परीक्षण - लैसार्ने Soln + ताजा बना FeSO_4 + FeCl_3 Soln + dil. HCl	नीला रंग प्राप्त होता है	N - Present
	(b) सल्फर परीक्षण - लेड एसिटेट परीक्षण - CH_3COOH + लैसार्ने Soln + $(\text{CH}_3\text{COO})\text{Pb}$	काला अवक्षेप प्राप्त नहीं होता	S - Absent
5.	गलनांक	536°C	डार्क फेनिल एमीन हो सकता है
6.	भौतिक का विग्रह परीक्षण - Comp. + Con. H_2SO_4 + Aq. NaNO_2	गहरी नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है	डार्क फेनिल एमीन निश्चित


रिक्त स्थानों का विवरण -



Result - Compound 'A'







Compound 'B' -



(डार्क फेनिल एमीन)

Teacher's Signature.....



उद्देश्य - दिए गए मिश्रण में ही कार्बनिक यौगिकों को जलाना।

उपकरण - टेस्ट ट्यूब, कीकर, हील्डर, कीमिच प्लेसक etc.

Comp. 'A' → रंग - हल्का पीला रंग
 गंध - कड़वी वादाम जैसी गंध
 प्रकृति - उदासीन

ज्वाला परीक्षा - धुँएँ के साथ जलता है अतः
 एरीमेटिक यौगिक है।

परीक्षण सारणी -

प्रयोग	परीक्षण	निष्कर्ष
1. N-test :- लैसानी + ताजा बना FeSO_4 विलयन + NaOH + HCl	प्रयोग में NaOH रंग नहीं आता	N - Absent
2. क्रियात्मक समूह परीक्षा - (a) नाइट्रोजन यौगिक का परीक्षण यूलिकन एवं वर्नर परीक्षण :- यौगिक में 2N - एल्कीडॉल डालने पर + कुछ बुँदें 10% CaCl_2 + अशुद्धि डालकर गर्म करने पर + टॉलिन अभिक्रिया में सीधा छानने पर	मूल पदार्थ का काला/भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है।	नाइट्रोजन समूह Present
3. गलनांक	114°C	m - डाई नाइट्रोजन
4. कार्बनिक यौगिक के लिए परीक्षा -		
- Comp. + NaOH + उबालना	लाल भूरा रंग	m - डाई नाइट्रोजन
- Comp. + ठंडा NaOH + Δ + ग्लूकोज	वैंगनी रंग	m - डाई नाइट्रोजन

Teacher's Signature.....

Compound - 'B'

प्रांरमित परीक्षा - रंग - रंगहीन

गंध - गंधहीन

प्रकृति - उदासीन

ज्वाला परीक्षा - छुँट के साव नहीं जलता

अतः एलिफैटिक भौगिक है।

परीक्षा सारणी -

प्रयोग	परीक्षा	निष्कर्ष
1. N-Test:- लैसानी Soln + ताजा वना $FeSO_4$ विलयन + $NaOH$ + HCl	प्रथमियन Blue रंग नहीं आता	N - Absent
2. क्रियात्मक समुह परीक्षा -		
(a) -COOH समुह का परीक्षा L.S विलयन + ताजा वना $FeSO_4$ विलयन + $NaOH$ + HCl + 5% H_2O	CO_2 गैस नहीं निकलती	-COOH समुह Absent
(b) फीनॉल समुह परीक्षा - Comp. का एक ही विलयन डालने पर + $FeCl_3$	वैंगनी रंग प्राप्त नहीं होता	-OH समुह अनुप.
(c) कार्बोनिल समुह परीक्षा 2,4 ब्रूफ डाइनाइट्रो फेनिल पदार्थ में अभिकर्मक डालकर गर्म करने पर।	पीला अवक्षेप प्राप्त नहीं होता	कार्बोनिल समुह Absent
(d) कार्बोहाइड्रेट का परीक्षा Comp. का जलीय विलयन 2m लेड एसिटेट + 10.5 gm	गुलाबी रंग प्राप्त होता है।	कार्बोहाइड्रेट उप.

$\Delta + 5ml \text{ } NH_4OH \text{ Soln} + 2 \text{ मिनट } \Delta$

Teacher's Signature.....

3. गलनांक

- Comp. + फैलिंग विलयन
+ 2 min तक गर्म
करने पर।

205°C
लाल रंग का
अवक्षेप प्राप्त

1 - ग्लूकोज
उप. है।

- बोरफॉर्मड अभिकर्मक +
2 min. तक गर्म करने पर


लाल अवक्षेप
प्राप्त होता है।

1 - ग्लूकोज
निश्चित है।

परिणाम :-

दिए गए मिश्रण में m-डाई नाइट्री
बेंजिन तथा 1 - ग्लूकोज उप. है।

Comp. A



(m-डाई नाइट्री बेंजीन)

Comp. - B

1 - glucose
 $C_6H_{12}O_6$

Teacher's Signature.....

ઉદ્દેશ્ય - દિે ગરે મિશ્રણ મેં સે કાર્બનિક યોગિક જ્ઞાત કરનાં ।

ઉપકરણ - ટેસ્ટટ્યુબ, લીકર, હૉલ્ડર, કૌનિય પ્લાસ્ટિક

Compound. 1. - ભૌતિક અવસ્થા = ઠોસ

રંગ = રંગહીન

ગંધ = ગંધહીન

પ્રકૃતિ = અમલીય

જ્વાલા પરીક્ષણ = કઢલી થુદું રૂં સાથે નહીં જલતા અતઃ દલિફેટિક યોગિક

પ્રેક્ષણ સારણી -
પ્રયોગ

1. N-પરીક્ષણ :- L.S વિલયન
+ તાજા બનાવેલ $FeSO_4$ Soln
 $NaOH + HCl$

પ્રેક્ષણ
પ્રતીયન બલુ
રંગ નહીં આતા

નિષ્કર્ષ
N - Absent

2. ક્રિયાત્મક સમુદ પરીક્ષણ -
કાર્બોક્સિલિક સમુદ પરીક્ષણ
અમલીય વિલયન + 5%
Comp. વિલયન ડાલને પર
 $NaHCO_3$

CO_2 ગૅસ
નિકલતી હૈ

-COOH સમુદ
અપ.

3. ગાલનાંક

$101^{\circ}C$

ઑવસીલિક અમ્લ
હીં સકતા હૈ

વિશ્લેષ પરીક્ષણ -

યોગિક + સાન્દ્ર H_2SO_4 +
ગરમ કરને પર

$CO_2 + CO$ ગૅસ
નિકલતી હૈ

ઑવસીલિક
અમ્લ અપ. હૈ

Comp. 2. અમ્લ ઉકાસીન Soln
+ $CaCl_2$ Soln મિલાને પર

સફેદ રંગ કા
અવધીપ

ઑવસીલિક
અમ્લ નિશ્ચિત

Compound II

भौतिक अवस्था = ठोस

रंग = रंगहीन / बैंगनी

गंध = हल्की गंध

उबाला परीक्षण = कदली छुंए के साबनही
जलता हलिकैदिक यौगिक है।

प्रकृति - अम्लीय

परीक्षण सारणी -

प्रयोग

परीक्षण

निष्कर्ष

1. N परीक्षण - L.S विलयन + ताजा बना FeSO_4 Soln + NaOH + HCl

प्रयोग blue रंग नहीं आता

N - Absent

2. क्रियात्मक समुह परीक्षण
(v) कार्बोक्सिलिक समुह परीक्षण
यौगिक का जलीय Soln + 5% NaHCO₃ Soln डालने पर।

CO₂ गैस नहीं निकलती

-COOH समुह अनुप.

3. फीनॉल समुह परीक्षण -
Comp. का हल्की हॉल विलयन + कुछ बुंदे $\text{FeCl}_3 \cdot \text{Soln}$

बैंगनी रंग प्राप्त होता है

फीनॉल समुह उप.

4. कार्बनिक यौगिक परीक्षण -

गलनांक

94°C

x - मैफॉल ही सकता है।

- x - मैफॉल यौगिक +

गुवैत अवक्षेप प्राप्त होता है

x - मैफॉल

 $\text{H}_2\text{O} + \text{FeCl}_3$

Present

Teacher's Signature.....

Comp. + जलीय NaOH + CuCl_2 (एक ग्रैम) + Cu चूर्ण + Δ	नीला रंग प्राप्त होता है	α -नैफथॉल निश्चित
--	-----------------------------	-----------------------------

Result :- दिए गए मिश्रण में ऑक्सीलिक अम्ल
तथा α -नैफथॉल उप. है।

Comp. I

 COOH

|

 $\text{COOH} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$


(ऑक्सीलिक अम्ल)

Comp. II

 $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{OH}$


SS

PH

 α -नैफथॉल

पैमाना -

x-अक्ष पर एक बड़ा खाना = 0.4 इंच
y-अक्ष पर एक बड़ा खाना = 1 इंच



क्षार 5A आयतन →

उद्देश्य :- चालकतामापी द्वारा NaOH (प्रबल क्षार) से अनुमापन करके HCl (प्रबल अम्ल) की सांद्रता ज्ञात करना।

उपकरण - चालकतामापी, चालकता सेल, पिपेट, ब्यूरेट, वीकर।

रसायन :-

(i) NaOH विलयन

(ii) HCl "

सिद्धान्त :-

$$N_1 V_1 = N_2 V_2$$

N_1 = अम्ल विलयन की नॉर्मलिता

V_1 = अम्ल विलयन का आयतन

N_2 = क्षार विलयन की नॉर्मलिता

V_2 = क्षार विलयन का आयतन

$$N_1 V_2 = 0.1 N \times \text{तुल्यविक बिंदु पर क्षार का आयतन}$$

$$N_1 = \frac{0.1 N \times \text{तुल्यविक बिंदु पर क्षार का आयतन}}{V_2}$$

$$= N_1 \times \text{तुल्यविक क्षार}$$

रैखण -

(i) HCl का तुल्यविक क्षार = 36.5 ml

(ii) अम्ल विलयन का आयतन = 10 ml

गठाना

$$N_1 V_1 = N_2 V_2$$

$$N_1 = ?$$

$$V_1 = 10 \text{ ml}$$

$$N_2 = 0.1 \text{ N}$$

$$V_2 = 7 \text{ ml}$$

$$N_1 \times 10 = 0.1 \text{ N} \times \text{तुल्यांक बिंदु पर क्षार का आयतन}$$

$$N_1 = \frac{0.1 \text{ N} \times \text{तुल्यांक बिंदु पर क्षार का आयतन}}{10}$$

$$N_1 = \frac{1 \times 7}{10}$$

$$N_1 = 0.07$$

HCl अम्ल का तुल्यांकी भार = 36.5 gm.

अतः सांद्रता = $N \times$ तुल्यांकी भार

$$= 0.07 \times 36.5$$

$$= 2.555 \text{ gm/Lit.}$$

प्रक्षेप सारणी

क्र.सं.	NaOH विलयन का आयतन (ml)	विलयन की चालकता
1	0.0	26.60
2	1	24.00
3	2	20.00
4	3	17.210
5	4	14.210
6	5	11.210
7	6	8.20
8	7	5.40
9	8	6.00
10	9	7.10
11	10	7.80
12	11	8.40
13	12	8.80
14	13	9.40
15	14	10.00
16	15	10.00
17	16	11.00
18	17	11.60
19	18	12.20
20	19	12.80
21	20	13.40
22	21	13.80

Result :- दिए गए अज्ञात अम्ल की (M.V) की
सांद्रता 2.56 gm/lit. है

Teacher's Signature.....

उद्देश्य - दिए गए अल्प विलेय लवण की विलेयता का निश्चिंत चालकता मापी विधि से ज्ञात करना।

उपकरण - चालकता मापी, चालकता सेल।

किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता सूत्र द्वारा दी जा सकती है -

$$\Lambda_v = k \times v \quad \text{--- (1)}$$

$$\Lambda_v = \frac{k \times 1000}{C} \quad \text{--- (2)}$$

अम्ल विलेय लवणी की विलेयता अत्यंत कम होती है अतः संतृप्त विलयन पर भी अम्ल विलेय लगायत प्रवृत्ति अविलय रहती है अतः अविलय लवणी के -

$$d_v = 100 \quad \text{--- (3)}$$

कौलराउडा सिद्धान्त के अनुसार -

$$d_{100} = \Lambda_{100}^+ + \Lambda_{100}^- \quad \text{--- (4)}$$

$$C = \frac{k \times 100}{\Lambda_{100}^+ + \Lambda_{100}^-} \quad \text{--- (5)}$$

लेकिन अविलेय लवणी की विलयन संचालकता की उत्पविलेय होती है।

$$\text{अतः } k_{\text{obs}} = k_{\text{obs}} - k_{\text{H}_2\text{O}} \quad \text{--- (6)}$$

इसलिए अल्पविलेय लवणी की विलेयता

$$C = \frac{(k_{\text{obs}} - k_{\text{H}_2\text{O}}) \times 100 \text{ gm/lit.}}{\Lambda_{100}^+ + \Lambda_{100}^-} \quad \text{--- (7)}$$

ગાંઝા

$$K = K_{\text{sol}^n} - K_{H_2O}$$

$$K = 1.200 - 0.954$$

$$K = 0.246 \text{ g}^{-1} \text{m}^{-1}$$

① પરચાલકતા
But 200 m

$$K = 0.00246 \text{ g}^{-1} \text{m}^{-1}$$

$$\text{અતઃ } S = \frac{0.00246 \times 1000}{143.4 \times 200} \times 116.70$$

$$S = \frac{0.246 \times 116.70}{143.4 \times 200}$$

$$S = 0.001 \text{ gm/Lit.}$$

$$\oplus - 200 + 100 = 100$$

$$\oplus - \frac{100 \times 100}{200 + 100} = 33.33$$

$$\oplus - \frac{100 \times 100}{200 + 100} = 33.33$$

प्रयोग सारणी -

तापमान = 20°C सेल स्थिरांक = 1 cm^{-1}

$$\text{जल की चालकता} = \frac{0.937 + 0.949 + 0.976}{3}$$

$$= 0.954$$

$$\text{जल की विशिष्ट चालकता} = 0.954 \times 1$$

$$= 0.954$$

क्र.सं.	BaSO_4 + H_2O की विशिष्ट चालकता Ω^{-1}	BaSO_4 की विशिष्ट चालकता $\Omega^{-1}\text{ cm}^{-1}$	माध्य $\Omega^{-1}\text{ cm}^{-1}$
1.	1.194	$1 \times 1.194 \times 1.194$	1.200
	1.200	$1 \times 1.200 \times 1.200$	
	1.206	$1 \times 1.206 \times 1.206$	

Result :- 20°C ताप पर अल्प विलय लवण की (BaSO_4) विलयता = 0.001 gm/lit.


Teacher's Signature.....

Exp. - 12

पैमाना -

x-अक्ष पर = 1 इकाई

y-अक्ष पर = 0.2 इकाई



चलाना

GE NO.

उद्देश

अव

कर

आ

र

सि

उद्देश्य :-

चालकतामापी विधि से दिए गए दुर्बल
अम्ल (CH_3COOH) की $N/100$ (प्रबल क्षार) से अनुमापन
कर सांद्रता ज्ञात करना।

आवश्यक उपकरण - चालकतामापी, चालकता सेल, पिपेट,
माइक्रोब्यूबल, बीकर etc.

रसायन :- (i) $N/100$ (ii) CH_3COOH

सिद्धान्त :- $N_1 V_1 = N_2 V_2$

N_1 = अम्ल विलयन की नॉर्मलिता

N_2 = क्षार विलयन की नॉर्मलिता

V_1 = अम्ल विलयन का आयतन

V_2 = क्षार विलयन का आयतन

$N_1 V_1 = 0.1 N \times$ तुल्यांकी बिंदु पर क्षार का आयतन

$N = \frac{0.1 N \times \text{तुल्यांकी बिंदु पर क्षार का आयतन}}{V}$

$N_1 = \text{सांद्रता} = N \times \text{तुल्यांकी भार}$

प्रीक्षण :-

(i) CH_3COOH का तुल्यांकी भार

(ii) अम्ल विलयन का आयतन = 10 ml

गठाना -

$$N_1 V_1 = N_2 V_2$$

जहाँ - $V_1 = 10 \text{ ml}$

$$V_2 = 2.4 \text{ ml}$$

$$N = 0.1 N$$

अतः $N_1 \times 10 = 0.1 N \times$ तुल्यांकी बिंदु पर क्षार का आयतन

$$N = \frac{0.1 N \times \text{तुल्यांकी बिंदु पर क्षार का आयतन}}{10}$$

$$N_1 = \frac{2.4}{100} = 0.024$$

अतः CH_3COOH अम्ल का तुल्यांकी भार = 60.06 gm

$$\text{संज्ञा} = N_1 \times \text{तुल्यांकी भार}$$

$$= 0.024 \times 60.06$$

$$= 1.441 \text{ gm/Lit.}$$

प्रश्न सारणी -

क्र.स.	मिलायी गये विलयन का आयतन (ml)	विलयन की चालकता Ω^{-1}
1	0.0	0.42
2	0.4	0.82
3	0.8	1.24
4	1.2	1.68
5	1.6	2.12
6	2.0	2.48
7	2.4	4.01
8	2.8	5.50
9	3.2	6.51
10	4.0	7.42
11	4.4	8.62
12	4.8	9.42
13	4.8	10.91


Result :- दिए गये CH_3COOH विलयन की सांद्रता

1.441 gm / lit. 1

પૈમાના -

x-અક્ષ પર = 1 ડગલ

y-અક્ષ પર = 0.1 ડગલ



ક્ષાર ડા માપતલ ->

उद्देश्य :- चालकतामापी विधि द्वारा दिए गए (HCl) प्रबल अम्ल विलयन की (NH₄OH) दुर्बल क्षार विलयन से अनुमापन की सांद्रता ज्ञात करना।

उपकरण :- चालकतामापी, चालकता सेल, पिपेट, माइक्रो ब्यूरेट, बीकर etc.

रसायन :-

(i) NH₄OH Solution

(ii) HCl Solution (N/100)

सिद्धान्त :- HCl Soln में NH₄OH Soln मिलाने पर अंतिम बिंदु तक चालकता घटती है तथा इसके पश्चात NH₄OH मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है।

$$N_1 V_1 = N_2 V_2$$

जहाँ = N_1 = अम्ल विलयन की नॉर्मलता

V_1 = अम्ल विलयन का आयतन

N_2 = क्षार विलयन की नॉर्मलता

V_2 = क्षार विलयन का आयतन

अतः $N_1 V_1 = \frac{0.1 N \times \text{तुल्यांकी बिंदु का क्षार आयतन}}{V_1}$

सान्द्रता = $N_1 \times \text{तुल्यांकी भार}$

प्रैक्षण :- प्रयुक्त दिए गए HCl की विलयन की सान्द्रता

40.0 ml

Teacher's Signature.....

मिलाए गए NaOH का आयतन (ml)		संगीकृत चालकता
1	0.0	
2	0.5	1.48
3	1.0	1.30
4	1.5	1.22
5	2.0	1.12
6	2.5	1.04
7	3.0	0.98
8	3.5	0.97
9	4.0	0.986
10	4.5	0.986
11	5.0	1.99
12	5.5	1.00

Result :- दिए गए अज्ञात HCl विलयन की सांद्रता
 0.2899 gm/lit प्राप्त होती है।